

618.1 O 6-905 X

Проф. П. М. БУЙКО

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПУЗЫРНОВЛАГАЛИЩНЫХ СВИЩЕЙ У ЖЕНЩИН

TOCMEAUSAAT VCCP





п. м. буйко

618.1

Герой Советского Союза, профессор, доктор медицинских наук

5-905

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПУЗЫРНОВЛАГАЛИЩНЫХ СВИЩЕЙ У ЖЕНЩИН

ПРИМЕНЕНИЕМ ПЛАЦЕНТАРНОЙ ТКАНИ

КЛИНИКО-ЭКСПЕРИ МЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

І посмертное издание

Республіканськи Науково Медичий Біблівтект



ГОСУДАРСТВЕННОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО УССР киев—1948 608-1

ПРЕДИСЛОВИЕ

15 октября 1943 года фашистские варвары сожгли живьем профессора Петра Михайловича Буйко за связь с партизанами, ведшими беспощадную борьбу с немецкими захватчиками. Тов. Буйко посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

Ни пытки, ни истязания не могли сломить железную волю этого коммуниста—ученого, покрывшего себя неувядаемой славой.

Петр Михайлович Буйко родился в семье рабочего 19 октября (ст. стиля) 1895 года в городе Бельске быв. Гродненской области. В селе Беловеж он окончил двухклассное училище и в 1908 году поступил в Петербургскую военно-фельдшерскую школу. В 1912 году после окончания школы Петр Михайлович работал младшим медицинским фельдшером в психнатрическом отделении бывшего Николаевского госпиталя в г. Петербурге, а затем в 1-м железнодорожном полку. Здесь после свержения царизма он был избран членом ротного совета и отдался революционной работе. В конце апреля месяца 1917 года Петр Михайлович получил назначение на работу в 1-ю железнодорожную поликлинику ЮЗЖД. В 1918 году вместе с рабочими железнодорожных мастерских он участвовал в восстании против центральной рады.

Поступив в 1918 году в Киевский медицинский институт, он вскоре вынужден был оставить его в связи с занятием Киева белополяками и скрываться в селе Турбово Киевской области, работая там фельдшером.

В 1920 году Петр Михайлович возвратился в Киев и продолжал учебу в институте, а также работу в лечебных учреждениях ЮЗЖД. В 1921 году его избрали председателем дорожного отдела профсоюза медицинских работников. В этом же году Петр Михайлович вступил в ВКП(б).

Закончив в 1922 году Киевский медицинский институт, он получил назначение в г. Бердичев, где работал председателем окружного правления союза медсантруд, а затем в г. Белой Церкви до 1928 года заведывал окружным отделом здравоохранения. В этом же году Петр Михайлович в течение полугода специализировался в акушерско-гинекологических клиниках г. Ленинграда. В 1930 году его назначили на должность доцента акушерско-гинекологической клиники Киевского медицинского института. Одновременно он возглавлял Киевский научно-исследовательский институт Охматдета.

В 1938 году Петр Михайлович защитил диссертацию на степень кандидата медицинских наук и был избран на должность завкафедрой акушерства и гинекологии Киевского стоматологического института. В 1939 году он командовал медико-санитарным батальоном, участвуя в походе за освобождение Западной Украины.

В 1941 году Петр Михайлович защитил диссертацию на ученую степень доктора медицинских наук.

В первый же день наглого вторжения фашистов профессор Буйко добровольно ушел на фронт, вскоре был ранен и попал в плен. Ему удалось бежать и в г. Фастове установить связь с партизанами.

Работая как партизанский врач-хирург в октябре 1943 года, при попытке пройти в село для оказания помощи раненым, которых укрывало население, Петр Михайлович был схвачен фашистами. На этот раз фашисты не выпустили из своих лап профессора-партизана, они сожгли его, облив бензином.

* *

Диссертация профессора П. М. Буйко представляет оригинальное клинико-экспериментальное исследование. Автор впервые в мире предложил использовать плацентарную ткань в качестве свободного трансплантата при таком исключительно тяжелом заболевании, как пузырновлагалищные свищи у женщин.

Проф. Атабеков, виднейший специалист в области хирургического лечения пузырновлагалищных свищей, в предисловии к своей монографии "Мочевые дефекты и свищи у женщин и их оперативное лечение" писал, что хирургия здесь оказалась бессильной. Проф. П. М. Буйко разработал и подробно описал метод зашивания пузырновлагалищных свищей с применением плацентарной ткани в качестве свободного трансплантанта. Он не только разработал новый метод, но и доказал его эффективность в клинике. В этом заключается главное и основное достоинство этой оригинальной работы. Метод, предложенный проф. Буйко, подкупает своей простотой и может дать положительные результаты в руках любого хирурга.

Представляют исключительный интерес и теоретические предпосылки этой работы. Мысль о применении плацентарной ткани в качестве трансплантата при пузырновлагалищных свищах зародилась у Петра Михайловича еще в 1937 году. На II Всеукраинском съезде акушеров-гинекологов проф. Третьяков (Ашхабад) предложил вниманию съезда оригинальное экспериментальное исследование по пересадке плацентарной ткани человека животным (кроликам) при искусственно созданных дефектах кишечника. Проф. Буйко со свойственными ему энтузиазмом и настойчивостью взялся за изучение этого важного вопроса и решил применить плацентарную ткань при хирургическом лечении пузырновлагалищных свищей.

Эксперименты убедили его в правильности предложенного им метода: плацентарная ткань, как ткань биологически активная, может и должна быть использована. Проф. Буйко исходил из того известного положения, что плацента обладает исключительными литическими свойствами по отношению к органам брюшной полости и в силу этого может претендовать на исключительное место в смысле свободной пересадки.

Плацента содержит в себе биологические вещества исключительной ценности, такие, как фолликулин, пролан и гормон желтого тела, причем нужно признать, что биологическая активность плаценты полностью еще далеко не разгадана.

Патологоанатомические исследования, проделанные П. М. Буйко, показали, что плацентарная ткань довольно быстро (к концу первых суток) прочно слипается с серозной поверхностью мочевого пузыря и вызывает мощное разрастание грануляционной ткани, которая затем превращается в фиброзную, закрывающую свищевое отверстие полностью. Являясь стимулятором разрастающейся грануляционной ткани, плацента оказывает исключительно благоприятное влияние на характер рубцовой ткани, которая размягчается и становится более эластичной.

Методика проф. Буйко в дальнейшем нашла полное подтверждение и в клинике проф. Л. Д. Мельника (Акушерско-гинекологическая клиника Киевского медицинского института им. акад. А. А. Богомольца). Работая с плацентарной тканью при долго незаживающих язвах, мы также можем подтвердить ее исключительную биологическую активность.

Конечно, монография проф. П. М. Буйко не дает исчерпывающего ответа на целый ряд вопросов, но это нисколько не уменьщает ее исключительной ценности.

Работа проф. П. М. Буйко как новатора в области изыскания способов лечения пузырновлагалищных свищей будит творческую мысль, указывает путь дальнейших изысканий в этом направлении.

Член-корреспондент АН УССР, проф. А. Ю. ЛУРЬЕ Доцент В. Н. САВИЦКИЙ

1. ВВЕДЕНИЕ

В дореволюционное время в России число больных с мочеполовыми фистулами было довольно значительным. Большинство
этих больных приходилось на села и особенно на те, где полностью отсутствовала квалифицированная медицинская помощь

для рожениц.

Нагляднее всего выражает это Груздев. Он говорит: "Весною с открытием навигации и особенно, когда начинается учебный год, Казанская акушерско-гинекологическая клиника подвергается настоящей осаде со стороны больных с мочеполовыми свищами, съезжающихся сюда за помощью со всех сторон восточной России".

По данным Малиновского, приведенным в его солидной работе "К этиологии и терапии свищей полового канала женщины", можно составить еще большее представление о количестве имевшихся в то время больных мочеполовыми свищами. Так например, за отрезок времени в 15 лет эти больные составляли 2,1% по отношению ко всем прошедшим через амбулаторию Казанской акушерско-гинекологической клиники, а стационарных больных было 7,49%, причём в подавляющем большинстве это были приезжие из глухих населенных пунктов.

Недаром Груздев придавал большое значение тому, чтобы каждый земский врач обязательно умел оказывать оперативную помощь при мочеполовых свищах. Он говорил: "Умение оказать оперативную помощь при влагалищнопузырном свище должно в такой же мере входить в круг практических познаний земского врача, как и умение наложить щипцы, зашить свежий разрыв

промежности и т. д.".

Сказанное выше свидетельствует о том безотрадном положении, в каком находились трудящиеся женщины в смысле возможности получения квалифицированной медицинской помощи

при родах в бывшей царской России.

В настоящее время, благодаря постоянным заботам коммунистической партии и советского правительства о благосостоянии трудящихся, а также благодаря непосредственному руководству, осуществляемому органами здравоохранения по расширению и качественному улучшению родильной помощи во всех уголках

нашей необъятной родины, созданы все условия для того, чтобы количество женщин с мочеполовыми фистулами в результате осложненных родов, становилось все меньше и меньше.

Количество фистулёзных больных уменьшается из года в год; это подтверждается статистикой, приведенной Александровым в работе: "Обзор свищей женского полового канала за 15 лет

(1917 - 1931)".

Однако, несмотря на значительное расширение сети родовспомогательных учреждений, а также на большое увеличение числа акушерок в селах, все же мы встречаем женщин с мочеполовыми свищами, образовавшимися вследствие осложнённых родов.

Эти свищи вызывают чрезвычайно тяжелые страдания. От постоянного истечения мочи появляются тягостные осложнения. Вначале возникает раздражение наружных половых, а также смежных частей, вызывающее сильнейший зуд. Далее это состояние осложняется появлением экземы, фурункулов, а также язв как во влагалище, так и на наружных половых частях. Появившиеся осложнения обусловливают сильную боль.

Помимо этого больные обречены на тяжелые моральные страдания. Специфический запах постоянно истекающей и разлагающейся мочи сопровождает таких больных везде и всюду. Это обстоятельство способствует тому, что такая больная становится в жизни неполноценной, чуждается общества, ее преследует одна мысль, как бы поскорее и любым путем избавиться от своей ужасной болезни.

Если в отношении этиологии и диагностики мочеполовых свищей мы располагаем почти исчерпывающими данными, если классификация их хорошо разработана Малиновским и детализирована Мажбицем, то в отношении лечения этих свищей впереди предстоит ещё сделать достаточно много.

В последнее столетие лечение мочеполовых свищей проводилось преимущественно хирургическим путём, который постепенно совершенствовался. Нельзя, однако, считать, что методика лечения этих свищей уже окончательно выработана или достигла такой степени совершенства, что этот вопрос не нуждается в дальнейших изысканиях.

Многими авторами предложено значительное количество различных хирургических способов лечения мочеполовых свищей. Уже одно то обстоятельство, что этих способов предложено

весьма много, говорит о сложности этого вопроса.

Атабеков в предисловии к монографии "Мочевые дефекты и свищи у женщин и их оперативное лечение" указывает, что хирургия в области лечения фистулёзных повреждений пузырной стенки оказалась бессильной. Период признания этого бессилия совпадает как раз с расцветом хирургии. Этим, по всей вероятности, Атабеков хотел подчеркнуть неудовлетворительное со-

стояние вопроса об оперативном лечении мочеполовых свищей

в то время.

Считая, что хирургическое лечение мочеполовых свищей имеет определённые достижения, мы не должны всё же эти достижения переоценивать, так как известная доля неудач при радикаль-

ном лечении встречается не столь уж редко.

Ушаков по этому поводу говорит: "Хорошо, если больная сразу получает исцеление, обратившись за медицинской помощью; но нередки случаи, когда больная, подвергшись многочисленным операциям у различных хирургов, все-таки остается со свищом, доходя до крайней степени отчаяния и попыток к самоубийству. Поэтому вопрос хирургического лечения мочевых свищей должен тщательно изучаться, и всякое ценное предложение, улучшающее технику и результаты операции при свищах, использоваться".

Необходимо отметить, что особенно плохо обстоит дело с такими больными, которые уже неоднократно подвергались безуспешным операциям. В подобных случаях шансы на заживление свищей с каждым новым оперативным вмешательством всё более и более понижаются. Эти многочисленные оперативные вмешательства приводят часто к тому, что свищевые отверстия приводятся в такое состояние, что дальнейшее оперирование обычным способом фистулорафии становится невозможным. В таких случаях хирург вынужден искать более сложных путей для операции.

Среди поступающих в лечебное учреждение нам приходится встречать преимущественно молодых женщин, причём большинство из них, к сожалению, уже неоднократно подвергалось неудачной операции, что свидетельствует о настойчивом стремлении добиться во что бы то ни стало полного излечения.

Такие больные соглашаются на любую операцию и ложатся на операционный стол в надежде избавиться от тяжелого недуга. Они подчас в течение многих месяцев пребывают в лечебном учреждении и не желают выписываться, если не наступил пол-

ный эффект от оперативного вмешательства.

Вместе с тем необходимо указать и на то, что в случае удачной операции, которая избавляет женщину от имевшегося у нее по сути некоторого уродства, получает колоссальное удовлетворение не только больная, но и врач. Ведь излечение такой женщины дает ей снова возможность принимать активное участие в социалистическом строительстве. У нее сразу отпадает чувство той отчужденности, которое так естественно зарождается при появлении всех неприятных моментов, связанных с нарушением целости мочевого пузыря. Излечившаяся и покидающая лечебное учреждение женщина подчас не может даже подобрать слова для выражения благодарности за восстановление здоровья и трудоспособности.

Необычайная настойчивость, какую проявляют женщины с мочеполовыми свищами в своём стремлении к исцелению, застав-

ляет нас, помимо совершенствования старых способов дечения пузырновлагалищных свищей, изыскивать другие, более соверщенные методы с тем, чтобы шансы от первого пособия были как можно большими. Этого можно добиться лишь при том условии, если метод пособия при своей эффективности будет несложным и легко выполнимым в условиях любого стационарного лечебного учреждения.

Таким образом, необходимость дальнейшей разработки способов хирургического лечения пузырновлагалищных свищей ста-

новится совершенно очевидной.

Учитывая всю важность успешного лечения пузырновлагалищных свищей первой операцией и изыскивая новые методы лечения, мы остановились на применении плацентарной ткани в качестве свободного трансплантата при хирургическом лечении пузырновлагалищных свищей у женщин. Оперируя по этому методу, мы

получили ободряющие результаты.

Большой материал нашей клиники, расположенной на базе одного из крупнейших лечебных учреждений г. Киева, и близость солидного урологического отделения, руководимого проф. А. А. Чайка, создали особо благоприятные условия для успешного выполнения настоящей работы. Кроме того, некоторых больных мы оперировали в клинической акушерско-гинекологической больнице (база Киевского стоматологического института).

Для подтверждения благоприятного влияния плацентарной ткани на заживление пузырновлагалищных свищей нами проведены экспериментальные исследования на собаках в лаборатории кафедры патологической физиологии Киевского ветеринарного института под руководством доктора медицинских наук проф.

Н. П. Вашетко.

П. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛЕЧЕНИЯ ПУЗЫРНОВДАГАЛИЩНЫХ СВИЩЕЙ У ЖЕНЩИН

Хотя в древней литературе не упоминается о мочеполовых свищах, надо полагать, они наблюдались и у женщин весьма отдаленных от нас эпох. В сочинениях Гиппократа есть указания на то, что после трудных родов появляется недержание мочи, но подробности этой патологии не приводятся. По литературным данным, изучение мочеполовых фистул начато во второй половине XVI столетия. Впервые упоминают о них А. Paré (1570 г.) и F. Plater (1597 г.). В настоящее время имеется большое количество работ, посвященных этому вопросу; он разбирается авторами в различных направлениях.

До внедрения хирургического метода лечения пузырновлагалищных свищей применялась тампонация влагалища. Полагали, что при тампонации передняя стенка влагалища должна приподниматься, вследствие чего произойдет сближение краев свищевого отверстия вплоть до соприкосновения, а это последнее обстоятельство будет способствовать заживлению. Во избежание разъедающего действия мочи на края свищевого отверстия и в интересах лучшего заживления мочу отводили постоянным катетером.

Для тампонады влагалища пользовались различными материалами: корпией, губкой, навощённым холщёвым цилиндром, эластическим пузырём. Тампонируя, оставляли больных лежать на

протяжении 9 — 12 недель.

В литературе приводятся отдельные случаи излечения в результате применения описанного способа. Однако этот метод лечения, дававший ничтожные результаты, не мог, естественно, удовлетворить ни врачей, ни, тем более, больных. Помимо этого, пребывание в постели на протяжении 2—3 месяцев являлось чрезвычайно тягостным. Это заставляло врачей искать иные, более эффективные, меры лечения.

Другим распространённым методом лечения было прижигание краев свищевого отверстия. Это прижигание производилось калёным железом, а также химическими средствами. К числу наиболее употребительных химических средств относились ляпис, серная и хромистая кислоты. Способы прижигания имели значи-

тельное количество вариаций. Метод пользовался определённым вниманием и имел много сторонников. Результаты от этого способа также были далеко не блестящи, тем не менее в некото-

рых случаях все же наступало излечение.

Способ подобного рода лечения точечных свищей (прижигание палочкой ляписа), особенно вслед за родами, иногда себя оправдывает. В одном из таких случаев мы наблюдали полное закрытие точечного свищевого отверстия спустя месяц после родов.

Надо полагать, что именно в подобных случаях и у прежних авторов получались хорошие результаты, Но таких случаев, к сожалению, бывает мало, большинство же свищей имеет более или менее солидный диаметр и их лечение прижиганиями было

безуспешно.

Савостицкий указывает, что еще в 1663 г. предложено рациональное лечение пузырновлагалищных свищей посредством наложения кровавого шва. Но несмотря на то, что с тех пор прошло довольно много времени, результаты лечения остались неутешительными. "Дело, наконец, дошло до того, что некоторые даже известные хирурги стали сомневаться в возможности излечения наибольшей части пузырновлагалищных свищей и в достоверности сообщаемых об этом фактов" (Савостицкий).

Только после многочисленных опытов на трупах Nägele в 1812 г. сделал различные предложения для лечения пузырновлагалищных свищей посредством кровавого шва. Его предложения опять оживили этот отдел хирургии и дали толчок к дальчейшим исследованиям. И вот в конце первой и особенно в начале второй половины XIX столетия хирургическое лечение пузырновла-

галищных свищей сделало определенные успехи.

Iobert de Lamballe, разрабатывая хирургический метод лечения свищей, обратил внимание на значение подвижности мочевого пузыря. Он предложил при этих операциях отделять передний свод влагалища от матки. Оперируя по такому способу, он получил значительные успехи. Кроме того, он закрывал свищ лоскутами кожи, которые переносил с ягодиц, бедер и половых губ. Перед соединением этих лоскутов он освежал свищ.

G. Simon, критически разрабатывая способ Ламбаля, для получения ещё более надёжных результатов считал рациональным

накладывать на свищевое отверстие двойной шов.

Магіоп Sims, занимавшийся лечением пузырновлагалищных свищей и в подавляющем большинстве случаев неудачно, в конце концов пришел к мысли, что для достижения успеха необходимо хорошо обнажать операционное поле. Для этой цели он предложил желобоватое зеркало, а также стел сшивать свищевые отверстия не шелковыми нитками, а серебряной проволокой. С того времени, как он стал применять при операции свои новшества и метод расщепления, успешность операции, по утверждению автора, стала значительной. Его ученик Вогетап много работал

над хирургическим лечением пузырновлагалищных свищей и широко распространил способ Симса в Европе, где он получил на-

звание "американского".

Савостицкий считал, что в тот период была решена задача лечения пузырновлагалищных свищей. Он писал: "До этого времени излечение самых малых и лежащих самым благоприятным образом свищей считалось редким успехом; в настоящее же время для опытного хирурга даже в самых трудных случаях оно сделалось общим правилом, неизлечимость же—редким исключением".

Мы не можем согласиться с утверждением Савостицкого, что в этот отрезок XIX столетия полностью была разрешена задача лечения пузырновлагалищных свищей. Если бы это было так, то вряд ли в последующем, когда хирургическая техника и мысль развивались все глубже, результаты хирургического лечения свищей становились бы худшими. К тому же, если бы это было так, то не понадобилось бы отыскивать новые, более эффективные способы лечения. Повицимому, надо полагать, что как сейчас, так и в то время количество неудач, а в связи с этим и повторных операций было немало. Вот почему утверждение Савостицкого, с нашей точки зрения, является неубедительным.

Единственно, с чем необходимо согласиться, это то, что после работ lobert de Lamballe, Marion Sims и их исследователей лечение пузырновлагалищных свищей у женщин достигло таких успехов, что о другом способе лечения свищей, кроме опера-

тивного, не может быть и речи.

Малиновский говорит: "Лечение свищей женского полового аппарата в настоящее время может быть только оперативным. Всякие другие способы лечения фистул могут иметь только исто-

рическое значение".

Остановившись на том, что лечение пузырновлагалищных свищей должно быть только оперативным, мы сразу же сталкиваемся с вопросом о том, каким должен быть этот оперативный путь. Атабеков, например, считает, что оперативное вмешательство должно производиться влагалищным путём.

Лисовская утверждает, что обычный влагалищный метод часто дает неудачи, несмотря на дополнительные надрезы наружных половых частей и выкраивание разнообразных, часто очень причудливой формы лоскутов из стенки влагалища. Потому она

предпочитает путь интравезикальный.

Мы, со своей стороны, полагаем, что оперативное вмешательство при свищах, которые ещё ни разу не подвергались операции, должно, безусловно, производиться через влагалище. Но на данном этапе нам необходимо считаться с тем, что мы можем подчас встретить и таких женщин, которых неоднократное оперативное вмешательство привело к состоянию, требующему иных путей лечения. Вот почему нам кажется, что вряд ли стоит торопиться с категорическим решением этого вопроса вообще.

Как видно из последующих суждений Атабекова, он также считает, что есть такая категория свищей, когда обычный влагалищный путь является бесполезным, как бы ни был искуссен хирург. К подобным свищам Атабеков относит те, которые имеют длинный и узкий ход, а также свищи малого калибра, неподвижные и недоступные, расположенные высоко в куполе рукава или на его стенке. Для лечения таких свищей он рекомендует интравезикальный путь, предложенный Тренделенбургом и с точки зрения автора являющийся наиболее выгодным.

Следующий вопрос — это вопрос об эффективности существующих в настоящее время методов лечения пузырновлагалищных свищей. Эффективность, с нашей точки зрения, необходимо расценивать по результатам первой операции. Нужно сказать, что все же неудач от фистулорафии по существующим модификациям имеется немало. Об этом свидетельствует, с одной стороны, большое количество различных способов лечения свищей, а с другой — наличие неоднократно подвергавшихся операции

женщин, с которыми нам приходится встречаться.

Спасокукоцкий, предлагая свой метод зашивания пузырновлагалищных свищей, говорит: "Зашивание свища по справедливости считается одной из самых неприятных операций: незначительность и глубина операционного поля стесняют все движения, затрудняют действия ножом, иглой и делают операцию утомительной и хлопотливой. Другая неприятная сторона — это частые неудачи, заставляющие повторно прибегать к той же операции и зачастую так же безуспешно".

Спасокукоцкий считает, что причина неудач почти всегда кроется в том, что плохо освежаются края свищевого отверстия, и поэтому он предлагает свой способ фиксирования лигатурами краев свищевого отверстия для лучшего их освежения.

- Мы присоединяемся к мнению Спасокукоцкого о том, что хорошее освежение краев свища для его заращения играет значительную роль, но все же надо полагать, что немалую роль в заживлении свища играют и другие моменты.

Одним чрезвычайно важным, на наш взгляд, моментом является методика сшивания. Частота наложенных швов, их многоярусность и энергичное стягивание могут повести к нарушению питания ткани мочевого пузыря, а вследствие этого и к частичному некрозу краев свищевого отверстия. Свищ, таким образом, не только рецидивируег, но и делается больше, чем был до операции.

Надо полагать, что и шовный материал также имеет значение. Новацкий говорит, что "вокруг растительных нитей почти всегда развиваются воспаление и нагноение в канале, через который нити проникают", Наши экспериментальные данные также показывают, что шелковые швы вызывают воспаление и нагноение в соприкасающейся с ними ткани мочевого пузыря.

Полагают, что рецидив свища возникает вследствие постоянного разъедающего действия мочи на швы. На этом основании предложены способы зашивания пузырновлагалищных свищей, при которых наложенные швы не подвергались бы действию мочи.

Если присмотреться к жизни наших клиник, то надо сказать, что чаще всего в числе страдающих мочеполовыми свищами приходится встречать женщин, которые уже неоднократно подвергались безуспешным операциям. Значительно реже мы видим таких больных, у которых с момента возникновения свища операция еще не предпринималась. Это обстоятельство объясняется тем, что в большинстве случаев такое тяжелое осложнение возникает после родов, протекавших без высококвалифицированной помощи; понятно, что его чрезвычайно редко можно встретить в городах. По данным родильных учреждений г. Киева пузырновлагалищные свищи встречаются лишь в единичных случаях. Что же касается более частых осложнений свищами при родах, протекавших в селе, нередко без квалифицированной помощи, то больные женщины в первую очередь попадают в районную больницу, где и подвергаются операции. Если принять во внимание сложность операции, а также и то, что даже в руках опытных хирургов в клиниках она не всегда проходит успешно, то станет понятно, что в малой больнице на периферии, успех часто бывает еще меньший. Тогда прибегают к повторным вмешательствам с еще меньшими шансами на услех.

Таким образом, женщина, страдающая пузырновлагалищным свищом, до поступления в клинику подвергается подчас неоднократным операциям. Отсюда напрашивается тот вывод о необходимости отыскания такого метода оперативного лечения пузырновлагалищных свищей, который не отличался бы особенной сложностью, был бы доступен любому хирургу и обеспечивал бы наи-

большее количество заживлений после первой операции.

К сожалению, существующие в настоящее время способы оперативного лечения свищей сложны и не дают желаемых результатов.

Пластические способы в громадном большинстве случаев либо сразу дают неблагоприятные результаты, либо приходится решаться на многочисленные повторные операции. Даже опытные хирурги высказывались в том смысле, что хорошие результаты операции зависят скорее всего от искусства хирурга. Однако в чем заключается это искусство? Вряд ли можно согласиться с подобным взглядом. Применение рациональной методики при оперативном лечении пузырновлагалищных свищей и получение благоприятных результатов от произведенной операции по выработанной методике и будет искусством. Таким образом, оперативная методика и искусство хирурга, как наука и искусство, имеют некоторое единство. Нам кажется, что лучшие результаты оперативного лечения свищей у женщин, получаемые искусными

хирургами, являются следствием определенной методики, которая недостаточно четко описывается, вследствие чего другие хирурги эту методику не воспринимают как следует, уклоняются от нее, и, естественно, получают иные результаты.

Неудачи при зашивании пузырновлагалищных свищей приводили к тому, что хирурги искали обходные пути. Предпринималось полное выключение мочевого пузыря с пересадкой мочеточников в кишку, полное выключение пузыря с образованием искусственного мочевместилища из того или иного отдела кишечника. Наконец, искали и "срединный примиряющий путь", например, заимствование соседних органов для закрытия дефекта пузыря (мобилизация и низведение матки по Волковичу), сложные разрезы с широкой отсепаровкой влагалищной стенки, общирным обнажением пузыря вплоть до боковых стенок влагалища и дальнейшее зашивание пластическим путем (способ Атабекова).

Мы считаем главной причиной искания этих обходных путей то обстоятельство, что после неоднократных операций, предпринимаемых с целью закрытия свища, последний доводился до такого состояния, когда обыкновенная фистулорафия далее казалась бесцельной. Сюда относятся операции кольпоклеизиса, эпизиоклеизиса, усовершенствованная Роммом операция Фройнда (закрытие свищевого отверстия телом матки), а также атипиче-

ские операции Мандельштама.

Наиболее благоприятные результаты от оперативного лечения пузырновлагалищных свищей получил Атабеков. Он разработал свой метод расширенного расщепления. До этого, проводя расщепление в узких рамках, он имел незначительный успех.

Выработанный Атабековым метод имеет своей целью обеспечить полную подвижность мочевого пузыря. Со своей стороны, активное состояние пузыря ведет к уменьшению дефекта, а следовательно, и к лучшему заживлению. Автор считает, что чем точнее и лучше произведена отсепаровка мочевого пузыря от подлежащих тканей, тем больше шансов на достижение успеха. Всякая поспешность и недостаточная выдержка при выполнении этого момента операции может повести к неудачам.

Атабеков предлагает при оперативном лечении пузырновлагалищных свищей производить крестообразный или якореобразный разрез (в зависимости от локализации свища), а затем широко отсепаровывать мочевой пузырь от стенок влагалища и тазовых костей. После приведения мочевого пузыря в активное состояние свищевое отверстие сшивается в поперечном направлении узловатыми шелковыми швами с погружением внутрь освеженных краев раны.

Метод Атабекова, с нашей точки зрения, безусловно, является шагом вперед в деле оперативного лечения пузырновлагалищных свищей у женщин; он теоретически обоснован и дает неплохие результаты. Но этот метод является все же сложным и требует высокой квалификации хирурга и большого навыка ассистентов.


Шатунов предлагает после соответствующего разреза по Атабекову дополнительно отсепаровывать слизистую оболочку пузыря от краев свищевого отверстия, вытягивать ее из отверстия, а затем перевязывать лигатурой. После этого на мочевой пузырь накладывается двойной кисетный шов, а затем сшиваются лоскуты влагалищной стенки.

Мы считаем, что Шатунов еще больше усложняет способ Атабекова: выделение слизистой оболочки мочевого пузыря яв-

ляется довольно сложной манипуляцией.

Работая ряд лет над оперативным лечением пузырновлагалищных свищей по методу расщепления и стараясь проводить его по возможности так же широко, как это рекомендует Атабеков, мы все же не можем сказать, что результаты операции нас удовлетворяют. В большинстве случаев все же операция безуспешна.

Мы предприняли попытку найти такую ткань, которая, с одной стороны, явилась бы на первых порах трансплантатом для закрытия свищевого отверстия, а с другой — способствовала бы в дальнейшем развитию грануляционной ткани и скорейшему заживлению свищевого отверстия. Такой тканью могла быть плацентарная, являющаяся мало диференцированной, близкой к эмбриональной, и обладающая литическим свойством, богатая глютатионом, а также гормонами. Мы и применили ее в качестве свободного трансплантата при хирургическом лечении пузырновлагалищных свищей у женщин.



п. клиническая часть

О способах применения плацентарной ткани в качестве свободного трансилантата при хирургическом лечении пузырновлагалищных свищей у женщин

Мы пользовались плацентами родильниц, которые подвергались предварительно тщательному и всестороннему исследованию. Обязательно производилась реакция Вассермана и только при отрицательной реакции использовалась плацента в качестве мате-

риала для трансплантата.

Плаценту, предназначенную для использования при операции пузырновлагалищного свища, мы брали следующим образом: при рождении младенца и отделении его от матери пуповина зажималась кохеровскими пинцетами. Один из них накладывался у пупка младенца, а другой у наружных гениталей матери. Пуповину мы отрезали над кохеровским пинцетом у пупка младенца, а также не доходя на 2 см до пинцета, зажимающего пуповину у наружных гениталий матери. Получавшийся остаток пуповины мы удаляли, чтобы не было свисания пуповины. Плацента при выхождении из половых путей принималась в стерильную пеленку, покрывалась ею и помещалась в стерильный сосуд, который ставился в прохладное место, где температура воздуха не превышала +6°C. Кохеровский пинцет снимался с остатка пуповины до заворачивания плаценты в пеленку.

В таких условиях плацента сохранялась до использования не более суток. В большинстве случаев плацентарная ткань применялась при операциях не позднее чем через 12 часов после

рождения плаценты.

Техника применения плацентарной ткани была следующей: как только мы начинали операцию, сосуд с плацентой доставлялся в операционную. Установив в процессе операции необходимую величину трансплантата, мы с помощью стерильного пинцета или корнцанга обнажали плодовую поверхность плаценты и намечали участок для получения трансплантата. Обычно избирался участок, наиболее бедный кровью и расположенный между разветвлениями сосудов. Предварительно мы срезали с него нож-

ницами или скальпелем поверхностный слой, обнажая таким образом середину ворсинчатой части плаценты. Затем на обнаженной ворсинчатой части плаценты вырезывался ножинцами или скальпелем необходимой величины трансплантат и помещался в стерильный лоток. Обычно толщина трансплантата не превышала 2—3 мм, а площадь его равнялась 1—1,25 см².

Если свищевое отверстие было незначительным, с диаметром не более 5 мм, то края свищевого отверстия освежались со стороны слизистой оболочки влагалища, а затем к освеженным краям прикладывался приготовленный трансплантат. Этот трансплантат закрывал отверстие свища и прикреплялся к слизистой оболочке влагалища четырымя кетгутовыми швами (рис. 1).

Для сравнительно больших свищей нами была выработана другая методика операции, причем эта методи за также варииро-

вала в смысле места приложения трансплантата.

Предварительно производилось расщепление стенки влагалища от стенки мочевого пузыря вокруг свищевого отверстия; разрезы делались по методу Атабекова. Сделав якореобразный либо крестообразный разрез, мы отсепаровывали слизистую влагалища и освобождали мочевой пузырь от рубцов. После этого свищевое отверстие стягивалось Z-образным кетгутовым швом (рис. 2).

Если свищевое отверстие было значительным, мы иногда применяли кисетный шов. Кроме того, в случаях, когда тщательная отсепаровка была затруднена и полной подвижности мочевого пузыря добиться не удавалось, мы накладывали на сви-

щевое отверстие несколько узловатых кетгутовых швов.

Далее, по парной модификации на стянутое таким способом свищевое отверстие мы накладывали непосредственно на стенку мочевого пузыря плацентарный трансплантат необходимой величины (рис. 3). После этого слизистая оболочка влагалища зашивалась узловатыми кетгутовыми швами. Таким образом, трансплантат оказывался между стенкой пузыря и слизистой влагалища (рис. 4).

По второй модификации мы после закрытия свищевого отверстия Z-образным кетгутовым швом зашивали слизистую оболочку влагалища такими же швами, а затем соответственно свищевому ходу в поперечном направлении накладывали плацентарный трансплантат. Этот трансплантат покрывал место соединения краев слизистой в поперечном направлении, причем он прикреплялся четырьмя кетгутовыми швами к слизистой оболочке влагалища (рис. 5).

Приведем некоторые истории болезни женщин, оперированных нами по поводу пузырновлагалищных свищей.

Р. М., колхозница, 45 лет, поступила в клинику 3.XI.1938 г. с жалобами на частые кровотечения, которые продолжаются на протяжении нескольких месяцев.

Первые менструации появились на 16-м году жизни, установились сразу, наступая через 28 дней и продолжаясь 3—4 дня. Половую жизнь начала в 18 лет. Характер и тип менструации с началом половой жизни не изменился. Две беременности окончились срочными родами, дети живы. Первые роды—

на 23-м году жизни, вторые — в 30 лет.

Больная среднего роста, астенической конституции. Кожа и видимые слизистые бледны. Язык влажный, необложенный, живот мягкий, несколько болезненный. Мочеиспускание свободное, дефекация совершается правильно. Со стороны внутренних органов изменений не отмечено. Температура 36,4°, пульс 76 в минуту, удовлетворительного наполнения, ритмичный. Растительность на лобке по женскому типу. Большие и малые срамные губы развиты нормально, половая щель закрыта. Слизистая входа во влагалище бледна.

Внутреннее исследование: влагалище нормальной длины, шейка матки цилиндрической формы, утолщена, бугриста. На передней губе определяется кровоточащая эрозия. Наружный зев пропускает кончик указательного пальца.

Бимануальное исследование: матка в антефлексии — антеверзии, подвижна, немного увеличена, плотновата. Левый свод свободен, в правом определяется небольшой инфильтрат.

Произведена биопсия и установлен рак шейки матки.

5. XI. под общим эфирным наркозом сделаны лапаротомия и тотальное удале-

ние матки с придатками и прилегающей клетчаткой.

Послеоперационный период прошел удовлетворительно, операционные раны зажили первичным натяжением. На 7-й день после операции началось непро-извольное истечение мочи через влагалище.

При осмотре зеркалами Симса в правом углу культи влагалища обнаружено небольшое свищевое отверстие, из которого просачивалась во влагалище

моча; края свища чистые.

Анализ мочи: количество 100 см³. Реакция кислая. Цвет бледножелтый. Удельный вес 1014. Следы белка. Лейкоцитов 10—12 в поле зрения. Эритроциты выщелоченные изредка. Плоский эпителий, триппельфосфаты в небольшом количестве.

Хромоцистоскопия: имеется пузырновлагалищный свищ, захватывающий заднюю стенку мочевого цузыря. Диаметр свища не более 5 мм. Края свища чистые. Феномен с обеих сторон на 4-й минуте хорошей интенсивности. Диаг-

ноз: пузырновлагалишная фистула.

5. II. 1939 г. острой ложечкой вокруг свищевого отверстия произведено освежение слизистой оболочки влагалища (без наркоза), а затем двумя кетгутовыми швами подшит кусочек плаценты площадью около 1 см². Вставлен эластический катетер на 10 часов. 18. II при осмотре зеркалами Симса установлено, что свищевое отверстие зарубцевалось. Мочеиспускание восстановилось полностью. Больная выписана в хорошем состоянии и с восстановленной функцией мочевого пузыря.

Б. С., домашняя хозяйка, 24 лет, поступила в клинику 12.111.1939 г. с явлениями

истечения мочи через влагалище.

Первые менструации на 16-м году, наступают через 28 дней, длятся 5—6 дней. Половую жизнь начала в 21 год. Беременеда два раза, рожала в больнице. Оба раза роды продолжались по несколько дней и закончились наложением щипцов и извлечением мертвого ребенка. Последние роды 16.1 1939 г. Со времени последних родов не менструирует. Непроизвольное истечение мочи появилось через несколько дней после родов.

Больная ниже среднего роста, правильного телосложения. Питание удовлетворительное. Видимые слизистые оболочки бледны. Со стороны внутренних органов отклонений от нормы не обнаружено. Живот мягкий, безболезненный. Температура 36,7°, пульс 84 в минуту, удовлетворительного наполнения, рит-

мичный.

Растительность на лобке по женскому типу. Большие и малые срамные губы развиты нормально. Половая щель зияет, из нее выделяется моча. На промежности белесоватый рубец. Внутренняя поверхность бедер, а также




Рис. 1. Наложенный на свищ и прикрепленный кетгутовыми швами плацентарный, трансплантат.




Рис. 2. Отсепаровка слизистой влагалища от мочевого пузыря и наложение Z-образного кет-гутового шва.




Рис. 3. Закрытое трансплантатом свищевое отверстие.

Прерывистой линией показаны направление стянутого свищевого отверстия и z-образный шов, находящиеся под трансплантатом.




Рис. 4. Зашитая узловатыми кетгутовыми швами слизистая влагалища,

Прерывистой линией показан трансплантат, находящийся под слизистой оболочкой влагалища.




Рис. 5. Плацентарный трансплантат на слизистой влагалища соответственно закрытому свищевому отверстию.

Прерывистой линией показано направление свищевого хода под трансплантатом.

большие и малые губы резко раздражены вытекающей мочой. Слизистая входа

во влагалище бледна.

При внутреннем исследовании в верхней трети влагалища по задней и боковым стенкам прощупывается рубец в виде полукольца. Выше рубца определяется деформированная шейка матки, неподвижная и плохо выраженная. В переднем своде имеется отверстие с шероховатыми краями, свободно пропускающее средний палец.

Бимануальное исследование: матка в ретрофлексии, фигсирована, увеличена до размеров 6—7 недельной беременности, плотновата. Придатки не определяются. Диагональная конъюгата—11 см. На пальцах после исследования

кровь.

Осмотр зеркалами Симса: в переднем своде выше уретры и шейки мочевого пузыря виден пузырновлагалищный дефект диаметром в 2 см. Из свищевого отверстия свисают тяжи, на которых имеется значительное отложение солей. В цистоскоп свищ осмотреть не удалось вследствие резкой раздражимости слизистой пузыря. Края свища покрыты серочато-желтым налетом. Посев мочи дал рост стафилококка и кишечной палочки.

Диагноз: пузырновлагалищная фистула.

Терапия: промывание пузыря, сидячая ванна, смазывание свища 5% уксусом, прикладывание тампона с вазелиновым маслом.

От 12. III до 23. IV свищ очистился от налета и солей. Раздражение наруж-

ных гениталий и внутренней поверхности бедер исчезло.

Анализ мочи: количество 60 см³. Реакция щелочная. Цвет бледножелтый. Удельный вес 1025. Моча мутновата. Белка 0,33%, сахара нет. Лейкоцитов 50—70 в поле зрения. Плоский эпителий, триппельфосфаты в небольшом количестве.

28. IV под гексеналовым наркозом произведена фистулорафия. Сделан якореобразный разрез по Атабекову и отсепарованы лоскуты слизистой влагалища от мочевого пузыря. На края мочевого пузыря, освобожденные таким образом от рубцов, в поперечном направлении наложен Z-образный кетгутовый шов, которым стянуты края мочевого пузыря и закрыто свищевое отверстие. Поверх стянутых швом краев непосредственно на стенку мочевого пузыря наложен кусочек плаценты общей площадью в 1 см² и толщиною 1½—2 мм. На слизистую влагалища наложены узловатые кетгутовые швы. Вставлен эластический катетер на 10 часов.

Со второго дня больная стала мочиться самостоятельно. Жалобы на боли внизу живота. Послеоперационный период осложнился двусторонним пиелитом,

протекавшим благоприятно.

28. VI при осмотре зеркалами Симса свищевое отверстие найдено зарубцевавшимся. Мочеиспускание произвольное. Выписана в хорошем состоянии.

О. Е., колхозница, 24 дет, поступила в клинику 15. IV. 1939 г. по поводу

истечения мочи через влагалище.

Первые менструации на 16-м году жизни, по 3—4 дня ежемесячно. Половую жизнь начала в 22 года, на первом же году забеременела и доносила до конца. Рожала 3½ месяца тому назад в районной больнице. Роды продолжались трое суток и закончились наложением щипцов. Плод извлечен мертвым. Находилась в районной больнице до 9.IV. С момента родов не менструировала. Через 3 недели после родов появилось непроизвольное истечение мочи через влагалище.

Больная среднего роста, правильного телосложения. Отклонений от нормы со стороны внутренних органов не обнаружено. Температура 36,4°, пульс 78 в минуту, хорошего наполнения, ритмичный. Растительность на лобке по женскому типу. Большие и малые губы развиты нормально. Половая щель зияет, из нее выделяется моча. Внутренняя поверхность бедер, а также большие и малые губы резко раздражены мочой. Задняя спайка разрушена и на ее месте виден белесоватый рубец. Слизистая входа во влагалище бледновата.

При внутреннем исследовании в верхней трети влагалища, на задней и бо-ковых стенках прощупывается полукольцевой рубец. Сейчас же выше опре-

деляется деформированная щейка матки со значительным количеством рубцов, неподвижная и плохо выраженная. Наружный зев пропускает конец указательного пальца. В переднем своде имеется отверстие, свободно пропускающее два поперечных пальца.

Бимануальное исследование: матка в ретрофлексии, фиксирована, несколько увеличена, плотновата. Придатки не прощупываются. Диагональная конъю-

гата 11,5 см. На пальцах после исследования кровь.

Осмотр зеркалами Симса: в переднем своде выше уретры и сфинктера мочевого пузыря виден дефект пузырновлагалищной стенки с выпячиванием слизистой мочевото пузыря во влагалище; слизистая резко кровоточит. В левом углу выпадающей слизистой видно отверстие мочеточника. Края дефекта в рубцах, рубцевые изменения заходят на боковые стенки влагалища. Цистоскопия не удалась.

Анализ мочи 28.IV: количество 7 куб. см. Реакция слабо кислая. Цвет бледножелтый. Удельный вес 10,18. Белка 0,066%. Лейкоцитов 60 — 80 в поле

зрения. Эритроциты малоизмененные, единичные.

Диагноз: пузырновлагалищная фистула.

Применены промывание мочевого пузыря, вазелиновый тампон во влагалище, смазывание наружных гениталий и внутренней поверхности бедер ва-

зелином.

5. V под хлороформным наркозом сделан якореобразный разрез по Атабекову и отсепарованы лоскуты слизистой влагалища от мочевого пузыря. На края дефекта, освобожденного таким образом от рубцов, наложен Z-образный кетгутовый шов в поперечном направлении. Края дефекта мочевого пузыря стянуты. Поверх стянутого дефекта непосредственно на стенку мочевого пузыря наложен кусочек плаценты общей площадью в 1,5 см² и толщиною до 2 мм. После этого слизистая влагалища защита узловатыми кетгутовыми швами. Вставлен эластический катетер на 10 часов.

Со второго дня после операции больная стала мочиться произвольно. Послеоперационный период осложнился левосторонним пиелитом, от которого

больная вскоре оправилась.

9.VI при осмотре зеркалами Симса пузырновлагалищный дефект найден зарубцевавшимся; лишь в одном месте рубца определялось точечное отверстие, из которого просачивалась моча. Больная выписана в удовлетворительном состоянии с предложением явиться через два месяца в клинику для осмотра.

В октябре 1939 г. О. Е. прибыла в клинику. Чувствует себя здоровой. При осмотре зеркалами выявилось, что свищевое отверстие полностью зарубцевалось. Мочеиспускание нормальное.

А. А., колхозница, 24 лет, поступила в клинику 10.V.1939 г. по поводу

истечения мочи через влагалище.

Первые менструации появились на 15-м году жизни, наступали каждые 4 недели и длились 3—4 дня. Половую жизнь начала в 23 года. С началом половой жизни тип и характер менструаций не изменились. Вскоре забеременела и доносила до конца. Полтора месяца тому назад рожала в районной больнице. Роды продолжались четверо сугок и закончились наложением шипцов, причем был извлечен мертвый плод. На другой день после оперативного вмешательства появилось истечение мочи через влагалище. В больнице пробыла две недели.

Больная среднего роста, правильного телосложения. Язык влажный, необложенный. Живот мягкий, безболезненный. Со стороны внутренних органов изменений не обнаружено. Температура 36,8°, пульс 80 ударов, хорошего нанаполнения, ритмичный. Внутренняя поверхность бедер, большие и малые, срамные губы раздражены мочой. Растительность на лобке по женскому типу. Малые губы несколько выступают за большие. Половая щель приоткрыта, из нее каплями вытекает моча. На промежности белесоватый рубец.

Внутреннее исследование: влагалище несколько укорочено; в верхней трети имеется рубец в виде полукольца на задней и боковых стенках влагалища. Сейчас же за рубцом определяется деформированная шейка матки. В перед-

нем своде несколько влево определяется дефект стенки, свободно пропускаю-

щий средний палец в полость мочевого пузыря.

Бимануальное исследование: матка в антефлексии, подвижна, немного увеличена, илотновата. Боковые своды несколько сужены. Придатки не прощупываются. Диагональная конъюгата 11 см.

При осмотре зеркалами Симса видно рубцевое полукольно, занимающее заднюю и боковые стенки влагалища. В переднем своде несколько слева виден дефект влагалищнопузырной стенки диаметром до 21/2 см.

Диагноз: пузырновлагалищная фистула.

Хромоцистоскопия: феномен справа на 6-й, слева на 8-й минуте, хорошей интенсивности. Дефект стенки мочевого пузыря расположен слева, впереди от устья мочеточника. Устье мочеточника отстоит от края дефекта на 1-2 мм.

Применены сидячие ванны, смазывание раздраженных мест вазелином. Анализ мочи; количество 10 см3, реакция кислая, цвет бледножелтый, мутноватая. Следы белка, сахара нет. Лейкоцитов 5 - 8 в поле зрения, эритроцитов малфизмененных 8 — 10 в поле зрения. Плоский эпителий в незначительном количестве. Слизи немного.

26. V под эфирным общим наркозом после соответствующей подготовки рубцевое полукольцо рассечено. Произведен крестообразный разрез по Атабекову. Дефект освобожден от рубцов, достигнута подвижность мочевого пузыря. Затем дефект пузыря стянут Z-образным кетгутовым швом, а поверх стянутого дефекта непосредственно на стенку мочевого пузыря наложен трансплантат пла-центы площадью до 11/2 см². Поверх кусочка плаценты слизистая оболочка влагалища зашита кетгутовыми узловатыми швами. Вставлен эластический катетер на 10 часов.

После извлечения катетера больная стала мочиться произвольно. На 14-й день после операции у больной возник левосторонний пиелонефрит, от которого она вскоре оправилась. При осмотре зеркалами Симса на месте бывшего дефекта найден рубец. Просачивания мочи нет. Мочевой пузырь функционирует нормально. 28.VI больная выписана здоровой.

К. О., колхознина, 26 лет, поступила в клинику 27.Х1.1939 г. по поводу истечения мочи через влагалище.

Первые менструации появились на 18-м году, наступали через каждые 28. дней и продолжались 2 — 3 дня, Половую жизнь начала в 24 года. С началом половой жизни тип и характер менструаций не изменился. Спустя несколько месяцев забеременела, беременность доносила до конца и 5 месяцев тому назад самостоятельно родила. Роды продолжались трое суток. В послеродовом периоде были повышенная температура и ознобы. Вскоре после родов из влагалища начала вытекать непроизвольно моча. Менструаций со времени наступления беременности до настоящего времени не было.

Больная среднего роста, правильного телосложения. Язык влажный, необложенный, живот мягкий, безболезненный. Со стороны внутренних органов изменений не обнаружено. Температура 36,6°, пульс 76 в минуту, хорошего наполнения, ритмичный. Внутренняя поверхность бедер, а также большие и малые срамные губы в состоянии раздражения. Растительность на лобке по женскому типу. Наружные гениталии развиты нормально. Половая шель приоткры-

та, из нее вытекает моча.

При внутреннем исследовании на задней стенке влагалища прощупывается рубец, заходящий на боковые стенки. В переднем своде имеется дефект влагалищнопузырной стенки, который свободно пропускает палец. Шейка матки укорочена, цилиндрической формы, наружный зев с надрывами.

Бимануальное исследование: матка в антефлексии, подвижна, атрофична плотновата; придатки не определяются. Диагональная конъюгата 11,5 см.

Осмотр зеркалами Симса: на задней стенке влагалища виден полукольцевой рубец, который заходит на боковые стенки. В переднем своде несколько влево виден дефект влагалищнопузырной стенки с диаметром в 11/2 см. Дефект в рубцах, края его чистые.

Хромоцистоскопия: феномен справа на 5-й, слева на 6-й минуте, хорошей интенсивности. Дефект стенки мочевого пузыря впереди от устья мочеточника. Устье мочеточника отстоит от края дефекта на 3—4 мм.

Диагноз: пузырновлагалищная фистула.

Применены сидячие ванны, места раздражения смазываются вазелином;

назначена почечная диета.

Анализ мочи: количество 100 см³. Реакция щелочная. Цвет бледножелтый. Удельный вес 1013. Моча мутновата. Белка 0,1%, сахара нет. Гиалиновых цилиндров 4-6 в поле зрения. Эритроцитов малоизмененных 3—4 в поле зрения, лейкоцитов 4—5 в поле зрения. Плоский эпителий в большом количестве, трип-

пельфосфаты в небольшом количестве.

8. XII под общим эфирным наркозом сделан крестообразный разрез по Атабекову. Дефект мочевого пузыря освобожден от рубцов, а затем стянут кетгутовым кисетным швом. Место стянутого швом дефекта прикрыто трансплантатом плаценты общей площадью в 1,4 см², который затем покрыт слизистой оболочкой влагалища. На слизистую влагалища наложены узловатые кетгутовые швы. Вставлен эластический катетер на 10 часов.

Через указанное время катетер вынут, и больная стала мочиться самостоя-

тельно. На 5-й день больная встала с постели. Мочится произвольно.

26. XII при осмотре зеркалами Симса на передней стенке влагалища ближе к переднему своду найден рубец. Моченспускание нормальное. Больная выписана в хорошем состоянии.

Л. Х., фармацевт, 29 лет, поступила в акушерско-гинекологическую больницу 23. III. 1940 г. из Пуще-Водицкого родильного дома по поводу затянувшихся родов.

Первые менструации на 14-м году, наступали каждые 28 дней; длились 2 дня. Половую жизнь начала на 23 году. Из трех беременностей две закончились абортом. Последнюю беременность доносила до конца. Роды при ягодичном предлежании затянулись и закончились извлечением мертвого плода за тазовый конец.

Через две недели после родов появилось истечение мочи через влагалище. Больная ниже среднего роста, правильного телосложения. Видимые слизистые оболочки розовые. Со стороны внутренних органов отклонений от нормы не обнаружено. Живот мягкий, безболезненный. Температура 36,4, пульс 72 в минуту, удовлетворительного наполнения, ритмичный.

Растительность на лобке по женскому типу. Наружные половые органы

развиты нормально. Половая щель приоткрыта; из нее вытекает моча.

Внутреннее исследование: шейка матки цилиндрической формы, наружный зев в виде поперечной щели с надрывами. В переднем своде определяется отверстие, которое свободно пропускает средний палец.

Бимануальное исследование: матка в антефлексии, ограниченно подвижна, увеличена до размеров 8-недельной беременности, туго эластической консистенции; своды свободны, придатки не определяются. Диагональная конъюгата—12 см.

При осмотре зеркалами Симса в переднем своде найден пузырновлагалищный свищ диаметром в 1,5 см; края свища чистые.

Диагноз: пузырновлагалишная фистула.

Анализ мочи: количество 100 см³. Реакция щелочная. Цвет желтый. Удельный вес 1015. Белка 0,0039%. Эритроцитов свежих 15-20 в каждом поле зрения, лейкоцитов 50-60 в поле зрения. Слизи большое количество.

24. IV под общим эфирным наркозом произведена фистулорафия. Сделан крестообразный разрез по Атабекову, затем слизистая влагалища отсепарована от мочевого пузыря (тщательной отсепаровки произвести не удалось). Свищевое отверстие стянуто тремя узловатыми кетгутовыми швами, поверх швов непосредственно на стенку мочевого пузыря наложен трансплантат плаценты. Затем слизистая оболочка влагалища защита кетгутовыми узловатыми швами, Введен эластический катетер на 10 часов.

Через указанное время катетер вынут, и больная стала мочиться произвольно. Послеоперационный период прошел хорошо, моча не протекала. Состояние

больной с каждым днем все улучшалось.

7. V при осмотре зеркалами Симса место бывшего свищевого отверстия найдено зарубцевавшимся, моча во влагалище не протекает. Л. Х. выписана здоровой.

Р. Л., колхозница, 33 лет, поступила в клинику 22. V. 1940 г. по поводу

истечения мочи через влагалище.

Первые менструации с 16 лет, ежемесячно по 4—5 дней. Живет половой жизнью 10 лет. Беременной была три раза: первые две беременности закончились срочными родами без осложнений; последнюю беременность доносила до конца, но роды $5^{1/2}$ месяцев тому назад были затяжными и закончились наложением щипцов в районной больнице. Через несколько дней после родов стала вытекать через влагалище моча. Со времени последней беременности не

менструирует.

Больная среднего роста, правильного телосложения, видимые слизистые оболочки бледнорозовые. Со стороны внутренних органов изменений не обнаружено. Температура 36,8°, пульс 82 в минуту, хорошего наполнения, ритмичный. Растительность на лобке по женскому типу, наружные половые органы развиты нормально, половая щель зияет, из влагалища вытекает моча. На промежности имеется рубец от бывшего разрыва, незначительное раздражение наружных половых частей.

Внутреннее исследование: во влагалище с левой стороны определяется углубление с рубцовыми краями. Шейка матки цилиндрической формы, с надры-

вами, пропускает конец пальца.

Бимануальное исследование: матка в ретрофлексии, небольщая, ограниченно подвижная, тугоэластической консистенции. Своды свободны, придатки не прощупываются. Диагональная конъюгата 11,5 см.

При осмотре зеркалами Симса в переднелевом своде видно свищевое от-

верстие диаметром в 11-12 мм. Края свища чистые.

Диагноз: пузырновлагалищная фистула,

Анализ мочи: количество 100 см³. Реакция щелочизя. Удельный вес 1009. Моча мутна. Следы белка. Лейкоцитов 20—30 в поле зрения. Эритроциты малоизмененные изредка. Плоский эпителий в большом количестве. Триппельфосфаты изредка.

Хромоцитоскопия: феномен справа на 5-й, слева на 8-й минуте, хорошей интенсивности. Дефект стенки мочевого пузыря расположен слева, спереди от устья мочеточника. Устье мочеточника отстоит от края дефекта на 2—3 мм.

26. V под эфирным наркозом произведен крестообразный разрез. Слизистая влагалища отсепарирована от стенки мочевого пузыря (отсепарировать полностью не удалось) Пузырновлагалищный свищ стянут кисетным кетгутовым швом. Поверх стянутого места непосредственно на стенку мочевого пузыря наложен кусочек плаценты, который покрыт слизистой влагалища. На слизистую наложены узловатые кетгутовые швы. Встановлен эластический катетер на 10 часов.

После операции через указанное время катетер вынут, и больная стала мочиться самостоятельно. На 6-й день начала ходить. При ходьбе мочу также удерживала. Послеоперационный период без осложнений. Состояние больной с каждым днем улучшалось, жалоб никаких не было.

11. VI при осмотре зеркалами Симса свищевое отверстие найдено зарубцевавшимся. Больная мочится произвольно. Выписана с полным восстановле-

нием функции мочевого пузыря.

Таким образом, мы видим, что в первой группе страдавших пузырновлагалищными свищами (7 человек) ни одна из больных до поступления в клинику ни разу не подвергалась операции защивания свища. Этиологическим моментом возникновения сви-

щей у большинства были затяжные роды, а у одной женщины пузырновлагалищный свищ образовался после операции. Четверо больных из этой группы поступили в клинику в таком состоянии, что требовали довольно длительного предварительного консервативного лечения вследствие раздражения наружных половых и смежных с ними частей, а также наличия язв во влагалище и налетов вокруг свищевого отверстия с отложением мочевых солей.

По давности возникновения свищи распределялись следующим образом: до 2 недель—1 случай, до 8 недель—1, до 3 месяцев—2, до 4 месяцев—1 и до 6 месяцев—2. Следовательно, все операции были нами произведены вскоре после образования свищей у этих больных. Исследования мочи перед операцией показали, что реакция в 2 случаях была кислой, в 1—слабокис-

лой и в 4-щелочной.

Одной из больных, у которой свищевое отверстие было незначительным, фистулорафия была произведена путем освежения краев свищевого отверстия острой ложечкой с последующим закрытием свища плацентарным трансплантатом; трансплантат был прикреплен узловатыми кетгутовыми швами к слизистой оболочке влагалища. Остальным 6 женщинам предварительно производилась отсепаровка стенки влагалища от стенки мочевого пузыря вокруг свищевого отверстия. Свищевое отверстие стягивалось кетгутовым швом, а затем на место стянутого свища непосредственно на стенку мочевого пузыря накладывался трансплантат плаценты, который покрывался слизистой оболочкой влагалища.

Послеоперационный период у 4 больных прошел без осложнений, а в 3 случаях осложнился пиелитом и пиелонефритом,

причем больные вскоре поправились.

Все 7 женщин, как это видно из историй болезни, после первой же операции выздоровели. Оперированные начинали мочиться в течение первых суток после операции, эластический

катетер вводился всего на 10 часов.

Приведем теперь истории болезни другой группы страдавших мочеполовыми свищами, до поступления в клинику подверсавшихся безуспешным операциям зашивания свища в разных лечебных учреждениях и лишь затем попавших к нам.

К. З., колхозница, 38 лет, поступила в клинику 25. П. 1939 г. по поводу

истечения мочи через влагалище.

Первые менструации появились на 16-м году жизни, установились сразу и наступали каждые 28 дней, продолжаясь 3—4 дня. Половую жизнь начала с 20 лет. С начала половой жизни тип и характер менструаций не изменились; последние месячные 4. П. Девять беременностей закончились родами, в двух случаях преждевременными. Предпоследние роды осенью 1937 г., по словам, больной, были затяжными, головка плода находилась в тазу в течение суток. Ребенок родился мертвым. Эти роды происходили в домашней обстановке. Вскоре после родов возникло непроизвольное истечение мочи через влагалище Операция зашивания свища оказалась безуспешной. Однако через некоторое

время наступила девятая беременность, во время которой истечение мочи через влагалище усилилось. В ноябре 1938 г. наступили преждевременные роды

на 7-м месяце. Ребенок умер.

Больная среднего роста, правильного телосложения, видимые слизистые оболочки бледнорозовые. Язык влажный, необложенный. Живот мягкий, безболезненный. Со стороны внутренних органов изменений не обнаружено. Температура 37,2°, пульс 80 в минуту, удовлетворительного наполнения, ритмичный. Растительность на лобке по женскому типу. Наружные гениталии развиты нормально. Половая щель приоткрыта, на промежности белесоватый рубец. Внутренняя поверхность бедер, большие и малые срамные губы резко раздражены мочой.

Бнутреннее исследование: влагалище нормальной длины. Шейка матки цилиндрической формы, наружный зев в виде поперечной щели с надрывом, распространяющимся на левый свод. В левом своде прощупывается рубец.

Бимануальное исследование: матка в антефлексии, подвижна, нормальной величины и плотности, придатки не определяются. Диагональная конъюгата

12 cm.

При осмотре зеркалами Симса виден старый рубец на месте бывшего разрыва шейки матки, переходящего на левый свод. В левом своде на расстоянии 2—3 мм от шейки матки, несколько кверху имеется небольшой свищ, из кото-

рого вытекает моча.

Цистоскопически определяется свищ в области левого мочеточника, отверстия мочеточника не видно. При хромоцистоскопии слизистая пузыря мутна, инъицирована; отверстие правого мочеточника не изменено, левого не видно. Феномен справа на 5-й минуте, слева краски не видно при наблюдении в течение 15 минут.

Диагноз: мочеточниково-пузырновлагалищная фистула.

Анализ мочи: количество 100 см³. Реакция кислая. Цвет бледножелтый. Моча мутновата. Белка следы. Сахара нет. Лейкоцитов 10—30 в поле зрения. Плоский эпителий в большом количестве.

Назначены сидячие ванны, смазывание раздраженной поверхности вазели-

ном, уротропин внутрь.

8. III влагалище раскрыто зеркалами Симса, протерто ватным шариком, смоченным в спирте, острой ложечкой произведено освежение краев свища, находящегося в левом своде. Вследствие обильного кровотечения освеженная поверхность прижата тампоном. Вслед за этим на свищевое отверстие наложен трансплантат плаценты общей площадью в 1 см², прикрепленный к слизистой влагалища четырьмя кетгутовыми швами. Операция проведена без наркоза. Вставлен эластический катетер на 10 часов.

После указанного срока катетер извлечен, и больная стала мочиться произвольно. Однако на 5-й день моча стала просачиваться во влагалище. На 7-й день выпал измененный трансплантат, и моча снова стала проходить через влагалище.

10. IV повторно подшит кусочек плаценты. Результат получился такой же. От предложенной более радикальной операции с отсепаровкой слизистой влагалища от стенки мочевого пузыря больная отказалась и выписалась из клиники.

К. Е., уборщица сахарного завода, 28 лет, поступила в клинику 2.IV.1939 г.

по поводу истечения мочи через влагалище.

Первые менструации на 18-м году жизни, установились сразу и наступали каждый месяц, продолжаясь 4—5 дней; последние месячные 6.И.1939 г. Половую жизнь начала с 19 лет. С началом половой жизни тип и характер месячных не изменились. Одна беременность окончилась в сентябре 1938 г. срочными родами, но мертвым плодом. Самостоятельные роды продолжались трое суток. После родов была повышена температура. Через 17 дней из влагалища внезапно стала выделяться моча.

До поступления в клинику больная подвергалась операции зашивания сви-

ща, но безуспешно.

Больная ниже среднего роста, правильного телосложения. Кожа и видимые слизистые оболочки слегка бледноваты. Язык необложенный, влажный. Живот мягкий, безболезненный. Со стороны внутренних органов отклонений от нормы не обнаружено. Температура 37,0°, пульс 84 в минуту, удовлетвори-тельного наполнения, ритмичный. Растительность на лобке по женскому типу. Большие и малые срамные губы развиты нормально. Половая щель слегка приоткрыта и из нее вытекает моча, окрашенная кровью. Наружные гениталии и внутренняя поверхность бедер раздражены мочой.

Внутреннее исследование: влагалище несколько укорочено, в верхней трети рубец, который размещается на задней стенке влагалища и заходит на боковые стенки, образуя полукольцо. Шейка матки несколько деформирована, в рубцах. В переднем своде дефект влагалищной стенки, проникающий в мо-

чевой пузырь и свободно пропускающий два поперечных пальца.

Бимануальное исследование: матка в ретроверзии, фиксирована, немного увеличена и плотна. Боковые своды несколько натянуты, придатки не определяются. При исследовании на пальцах кровь. Диагональная конъюгата

При осмотре зеркалами Симса в переднем своде виден дефект пузырновлагалищной стенки днаметром в 3 см. Края дефекта в рубцах, которые направляются к шейке матки и на боковые стенки влагалища. Из дефекта выпадает слизистая мочевого пузыря. Слева у самого края рубца видно устье мочеточника. Слизистая пузыря кровоточит. Цистоскопически свищ найден в области Литодиева треугольника, ближе к левому мочеточниковому отверстию.

Диагноз: пузырновлагалищная фистула.

Назначены сидячая ванна, промывание пузыря, смазывание краев свища

1% раствором молочной кислоты, а раздраженных мест—вазелином. Анализ мочи: количество 50 см³. Реакция щелочная. Удельный вес 1020.Цвет бледножелтый с кровянистым оттенком. Белка 0,33%. Сахара нет. Лейкоцитов 30-40 в поле зрения. Эритроцитов малоизмененных 16-20 в поле зрения. Плоский эпителий в незначительном количестве. В посеве небольшой рост кишечной палочки и стафилококка.

21. IV под общим эфирным наркозом сделан якореобразный разрез по Атабекову, мочевой пузырь освобожден от рубцов. На дефект наложены 4 узловатых кетгутовых шва, затем такими же швами зашита слизистая оболочка влагалища. Поверх зашитой слизистой влагалища в поперечном направлении наложен трансплантат плаценты, который прикреплен к слизистой влагалища четырьмя кетгутовыми швами. Вставлен эластический катетер на 10 часов.

Через 10 часов катетер вынут, и больная стала мочиться самостоятельно. На 9-й день после операции моча, по словам больной, в незначительном количестве стала просачиваться во влагалище, но произвольное моченспускание также сохранилось. 15. V поднялась температура до 38,2°, появились боли в левой половине живота, слева положительный симптом Пастернацкого. Послеоперационный период осложнился левосторонним пиелонефритом. Просачивание мочи во влагалище при этом несколько усилилось. Вскоре больная от этого заболевания оправилась.

26. V при осмотре зеркалами Симса свищевое отверстие оказалось значительно уменьшенным и достигало в днаметре 3 мм; вокруг свища обнаружено отложение солей. До 28. VI оставшееся в пузырновлагалищной стенке отверстие под влиянием лечения совершенно очистилось от солей. Боли в левой половине живота исчезли. Свищевое отверстие с трудом пропускало металлический катетер. Моча частично задерживалась в пузыре, частью же протекала

Еще два раза к свищу после предварительного освежения краев со стороны слизистой влагалища подшивался кусочек плаценты, но безуспешно. В связи с этим решено было произвести широкое расщепление по методу Атабекова. При расщеплении краев свища величина его была доведена до прежних размеров. Свищевое отверстие стянуто четырьмя узловатыми кетгутовыми швами, а поверх, непосредственно на стенку мочевого пузыря наложен трансплантат плаценты. Слизистая влагалища над трансплантатом зашита узловатыми кетгутовыми швами. Вставлен эластический катетер на 10 часов. В течение 10 часов после операции через катетер вышло несколько кубических сантиметров кровянистой мочи, а затем поступление ее прекратилось. Появились резкие боли в пояснице. Моча не выделялась. Предполагая, что в данном случае в рубец попали устья мочеточников, мы через 48 часов после операции распустили швы и с некоторым трудом удалили трансплантат плаценты¹, оставив мочевой пузырь открытым. Состояние больной после этого улучшилось, но моча стала снова выделяться через влагалище.

В дальнейшем в связи с гнойным воспалением левой почки больная была

переведена в урологическое отделение 2.

О. У., колхозница, 35 лет, поступила в клинику 4. IV. 1939 г. по поводу ис-

течения мочи через влагалище.

Первые месячные установились на 20-м году жизни, наступали через месяц и продолжались по 3—4 дня; последние менструации 3. IV. 1939 г. Половую жизнь начала с 24 лет. Первая беременность, наступившая вскоре после начала половой жизни, окончилась срочными родами. Вторая беременность год тому назад окончилась родами, которые продолжались 5 суток и потребовали наложения щипцов. Плод был извлечен мертвым. Через несколько дней появилось непроизвольное истечение мочи через влагалище.

До поступления в клинику на протяжении года больная три раза подвер-

галась операции, но безрезультатно.

Больная среднего роста, кожа и видимые слизистые оболочки бледноваты. Зев чистый, язык влажный, необложенный. Живот мягкий, безболезненный. Глухие тоны сердца и систолический шум на верхушке. Со стороны других внутренних огранов изменений не обнаружено. Температура 36,7°, пульс 80 в минуту, удовлетворительного наполнения, ритмичный.

Растительность на лобке по женскому типу. Внутренняя поверхность бедер, большие и малые срамные губы резко раздражены мочой. На промежности белесоватый рубец. Половая щель приоткрыта и из нее вытекает моча.

Внутреннее исследование: влагалище нормальной длины. На передней стенке определяется дефект. Передний свод выражен слабо. Шейка матки деформирована, наружный зев пропускает кончик пальца.

Бимануальное исследование: матка в антефлексии, нормальной величины, подвижна, немного плотновата. Своды свободны, придатки не прощупываются.

Диагональная конъюгата 12 см.

При осмотре зеркалами Симса на передней стенке влагалища, на уровне сфинктера мочевого пузыря и ниже его определяется дефект стенки влагалища и уретры, захватывающий шейку мочевого пузыря. На расстоянии 1½ см обнажена уретра.

Цистоскопия: разлитой цистит, феномен с обеих сторон на 6-й минуте, хо-

рошей интенсивности.

Диагноз: уретро-пузырновлагалищная фистула.

Анализ мочи: количество 60 см³. Реакция щелочная. Цвет бледножелтый. Удельный вес 1020. Моча мутная. Белка 0,65%. Сахара нет. Лейкоцитов 8—10 в поле зрения. Эритроцитов малоизмененных 50—60, выщелоченных 2—3 в каждом поле зрения. Плоский эпителий в умеренном количестве. Слизи много. Триппельфосфаты в большом количестве.

Назначены почечная диета, сидячая ванна, промывание пузыря, смазыва-

ние раздраженных мест вазелином.

28. IV влагалище раскрыто зеркалами Симса и протерто спиртом, края дефекта освежены острой ложечкой и дефект закрыт кусочком плаценты, прикрепленным четырьмя кетгутовыми швами к слизистой оболочке влагалища.

2 К моменту окончания диссертации автор не мог привести данных о даль-

нейшей судьбе больной.

¹ Извлеченный через 48 часов после операции плацентарный трансплантат был подвергнут гистологическому исследованию, причем оказалось, что типичное строение плацентарной ткани полностью сохранилось.

Вставлен эластический катетер на 10 часов. (Операция проведена без нар-

коза). Через 10 часов катетер вынут, и больная стала мочиться произвольно. На 5-й день после операции моча стала просачиваться во влагалище, а на 7-й день выпал резко измененный кусочек плаценты. 9.V появились отеки на лице и ногах. Послеоперационный период осложнился нефритом.

20. V осмотр зеркалами Симса: плацентарного трансплантата нет, вокруг

дефекта наличие свежих грануляций; дефект немного уменьшился.

28. VI в связи с закрытием клиники на ремонт больная была переведена в акушерско-гинекологическую больницу. Здесь 2.VII без наркоза снова про-изведено подшивание плацентарного трансплантата после предварительного освежения краев свищевого отверстия. На 7-й день моча стала просачиваться во влагалище, а на 9-й день выпал измененный трансплантат.

При осмотре зеркалами Симса вокруг свищевого отверстия найдены пыпные грануляции, дефект уменьшился, но через него протекает во влагалище моча. 23.VI при повторном осмотре зеркалами оказалось, что края свищевого отверстия зажили, отверстие уменьшилось наполовину, рубец стал розовым и

менее плотным.

Было решено произвести отсенаровку стенок влагалища от уретры и шейки мочевого пузыря вокруг дефекта и наложить кусочек плаценты непосредственно на стенку уретры и мочевого пузыря. 26.VII под новокаиновой анестезией произведен крестообразный разрез и отсенарована слизистая влагалища от стенки мочевого пузыря и уретры. На дефект ткани наложены три узловатых шва и поверх них трансплантат плаценты, который прикрыт слизистой влагалища. На слизистую влагалища наложены узловатые кетгутовые швы. Вставлен эластический катетер на 10 часов.

После извлечения катетера больная стала мочиться самостоятельно.

В послеоперационном периоде возникли явления обострившегося нефрита, медленно затихавшие затем под влиянием лечения. Мочеиспускание произвольное.

27.VIII при осмотре зеркалами Симса дефект найден зажившим, моча во влагалище не просачивалась. Больная выписалась с нормальной функцией мочевого пузыря и уретры.

Т. М., колхозница, 36 лет, поступила в клинику 5.ИІ.1939 г. по поводу

истечения мочи через влагалище.

Первые менструации появились на 18-м году жизни, установились сразу и наступали каждые 28 дней, продолжаясь 6—7 дней; последние месячные 14.П. 1939 г. Половую жизнь начала в 23 года. Из четырех беременностей две окончились срочными родами. Впервые родила через год после начала половой жизни, второй раз—5 лет тому назад. В промежутке между родами было два самопроизвольных аборта. Последний раз рожала дома, роды затянулись, а через несколько дней появилось истечение мочи через влагалище. До поступления в клинику больную дважды подвергали операции зашивания свища, но безуспешно.

Больная ниже среднего роста, астеничка, питание несколько ослабленное, Кожа и видимые слизистые оболочки бледны. Кожа легко собирается в складки, тургор ее несколько понижен. Со стороны внутренних органов изменений не обнаружено. Температура 36,8°, пульс 80 в минуту, хорошего наполнения, ритмичный. Растительность на лобке по женскому типу. Наружные половые органы развиты нормально. Половая щель приоткрыта. На промежности имеется белесоватый рубеи. Слизистая входа во влагалище, а также малые и большие срамные губы и внутренняя поверхность бедер раздражены мочой.

Внутреннее исследование: влагалище нормальной длины. Шейка матки цилиндрической формы, наружный зев с надрывами. В переднем своде прощу-

пывается рубец.

Бимануальное исследование: матка в антефлексии, подвижна, нормальной величины и плотности. Своды свободны. Придатки не определяются. Диагональная конъюгата 12 см.

При осмотре зеркалами Симса в переднем своде в области сфинктера мочевого пузыря виден пузырновлагалищный свищ 5—6 мм в диаметре; края свища чистые.

Диагноз: пузырновлагалищная фистула.

Назначено смазывание раздраженных мест вазелином.

Анализ мочи: количество 70 см³. Удельный вес 1020. Реакция слабо кислая. Белка и сахара нет. Лейкоцитов 1—3 в поле зрения. Эритроциты выщелоченные, единичные. Клетки плоского эпителия в небольшом количестве.

9. III влагалище раскрыто зеркалами Симса и протерто спиртом. Пулевыми щипцами шейка матки захвачена за переднюю губу и оттянута книзу. Произведено освежение краев свищевого отверстия и четырьмя кетгутовыми швами прикреплен трансплантат плаценты общей площадью немного больше 1 см². Вставлен эластический катетер на 10 часов.

После извлечения категера больная стала мочиться самостоятельно. С это-

го времени моча больше во влагалище не протекала.

22. П осмотр зеркалами Симса: трансплантат рассосался. На месте бывшего свищевого отверстия свежий рубец, не пропускающий мочи. Больная выписана в хорошем состоянии, с нормальной функцией мочевого пузыря.

Г. А., колхозница, 25 лет, поступила в клинику 20.IV.1939 г. по поводу исте-

чения мочи через влагалище.

Первые месячные появились на 16-м году жизни, каждые 28 дней, продолжительностью 3—4 дня; последние менструации 10.IV.1939 г. Половой жизнью живет с 20 лет. При первых родах в 1935 г., по словам больной, было запущенное поперечное положение, требовавшее оперативного вмешательства. Через несколько дней после операции появилось истечение мочи через влагалише. Больная утверждает, что ее оперировали по поводу свища 7 раз; последнее вмешательство произведено в 1938 г.

Больная ниже среднего роста, правильного телосложения. Язык влажный, необложеный. Живот чувствителен в области правого подреберья; определяется край печени, выходящий на один палец из-под реберной дуги. Со стороны других внутренних органов изменений не обнаружено. Температура тела 37,0°, пульс 78 в минуту, хорошего наполнения, ритмичный. Растительность на лобке по женскому типу. Наружные половые органы развиты нормально. Половая щель приоткрыта, слизистая входа во влагалище гиперемирована. На промежности белесоватый рубец.

Внутреннее исследование: влагалище нормальной длины. Шейка матки цилиндрической формы, наружный зев поперечный, имеются надрывы шейки. На средине передней стенки влагалища определяются рубцы, а также дефект, пропускающий неглубоко конец пальца.

Бимануальное исследование: матка в антефлексии, подвижна, нормальной величины и плотности. Боковые своды свободны, придатки не определяются.

Диагональная конъюгата 12 см.

При осмотре зеркалами Симса на передней стенке влагалища виден дефект уретры, захватывающий сфинктер мочевого пузыря. Уретра на протяжении $1^{1}/_{2}$ см разрушена.

Диагноз: уретро-пузырновлагалищная фистула.

Анализ мочи; количество 50 см³. Удельный вес 1015. Цвет соломенно-желтый. Реакция кислая. Моча мутна. Белка следы. Сахара нет. Уробилин и инликан в норме. Эритроциты выщелоченные единичные в препарате. Лейкоциты 25—40 в поле зрения. Плоского эпителия много.

23. IV произведена операция без наркоза в коленнолоктевом положении. Влагалище раскрыто зеркалами Симса, края дефекта освежены, наложен трансилантат плаценты общей площадью 3 см 2 и толщиной в $2-2^1/_2$ мм; трансилантат прикреплен четырьмя кетгутовыми швами. Введен эластический катетер на 10 часов.

После извлечения катетера больная стала мочиться самостоятельно. На 5-й день после операции моча стала просачиваться во влагалище, а на 10-й день выпал резко измененный трансплантат. При осмотре зеркалами выявлено

пышное разрастание грануляций вокруг дефекта. Моча в лежачем положении

больной задерживается.

28. VI в связи с закрытием клиники на ремонт больная переведена в акушерско-гинекологическую больницу. Здесь она еще два раза подвергалась операции, но трансплантат выпадал на 7-8-день, причем выявлялось пышное разрастание грануляций и изменение рубцовой ткани, образовавшейся вследствие неоднократных оперативных вмешательств. После третьей операции свищевое отверстие значительно уменьшилось и пропускало только металлический катетер, мочу больная стала удерживать.

В связи с настойчивым желанием больная была оперирована еще раз, но уже по методу расшепления с наложением трансплантата непосредственно на стянутую узловатыми кетгутовыми швами стенку уретры и мочевого пузыря.

Вмешательство оказалось безрезультатным.

Через 3 недели операция по этому же способу повторена.

После второй операции на 7-й день моча стала снова просачиваться во влагалище. При осмотре свищевое отверстие найдено значительно уменьшившимся, пропускающим только пуговчатый зонд¹. Б. А., домашняя хозяйка, 27 лет, 28. VI. 1939 г. поступила в акушерско-ги-

некологическую больницу по поводу истечения мочи через влагалище.

Первые менструации появились на 15-м году, установились сразу, пали каждые 28 дней и продолжались 3 дня; последние месячные 20. VI. 1939 г. Половой жизнью живет с 18 лет. Рожала три раза (в больнице). Живой родилась одна девочка. Последние роды 11 месяцев тому назад окончились наложением щипцов. На 20-й день после родов появилось истечение мочи через влагалище. Подвергалась операции зашивания свища. До поступления в акушерско-гинекологическую больницу свыше месяца лечилась во второй клинике Киевского медицинского института по поводу значительного раздражения наружных гениталий и смежных с ними частей, а также по поводу язв во влагалище и налетов вокруг свищевого отверстия. Вследствие закрытия клиники на ремонт была переведена в больницу для дальнейшего лечения.

Больная среднего роста, правильного телосложения. Видимые слизистые оболочки розовые. Язык влажный, чистый. Живот мягкий, безболезненный. Со стороны внутренних органов изменений не обнаружено. Температура 37,3°, пульс 82 в минуту, хорошего наполнения, ритмичный. Растительность на лобке по женскому типу. Наружные гениталии развиты нормально. Половая щель

зияет. На промежности большой белесоватый рубец.

Внутреннее исследование: шейка матки деформирована. На задней стенке влагалища прощупывается рубец, который переходит и на боковые его стенки в виде полукольца. В переднем своде определяется дефект стенки влагалища, проникающей в мочевой пузырь и пропускающий совершенно свободно два пальца. Шейка матки плохо выражена. Наружный зев слегка приоткрыт.

Бимануальное исследование: матка в антефлексии-антеверзии, подвижна, несколько увеличена, плотновата. Придатки не определяются. Диагональная

конъюгата 12 см.

При осмотре зеркалами Симса видны полукольцевой рубец и выпадающая слизистая оболочка мочевого пузыря, дефект стенки влагалища и мочевого пузыря в переднем своде, несколько влево. С этой же стороны приблизительно в 3 мм от края выпадающей слизистой видно устье левого мочеточника. Диаметр дефекта-свыше 3 см.

Диагноз: пузырновлагалищная фистула.

Анализ мочи: количество 30 см3. Реакция щелочная. Удельный вес 1021. Моча мутновата, цвет бледножелтый. Белка следы. Сахара нет. Лейкоцитов 10-20 в поле зрения. Плоский эпителий в большом количестве.

2. VII под гексеналово-эфирным наркозом сделан крестообразный разрез по Атабекову. Отсепаровать полностью слизистую влагалища от мочевого пузы-

¹ К моменту окончания диссертации этот интереснейший случай, к сожа-лению, не был доведен до конца. Сведений о дальнейшей судьбе больной, проявившей столь большую волю к издечению, нам получить не удалось. (Ред).




Рис. 6. Соединение мочевого пузыря с влагалищем непрерывным шелковым швом, А-влагалище; Б-мочевой пузырь; С-место соединения.




Рис. 7. Соединение краев отверстий мочевого пузыря и влагалища вблизи места первоначального соединения мочевого пузыря с влагалищем.

А-отверстие на передней стенке влагалища; Б-отверстие на задней стенке мочевого пузыря; С-соединение краев мочевого пузыря и влагалища.




Рис. 8. Соединенные края мочевого пузыря и влагалища.

А-свищевое отверстие во влагалище: В-свищевое отверстие в мочевом пузыре.




Рис. 9. Соединение периферических краев: отверстий влагалища и мочевого пузыря.

А—периферический край разреза влагалища; В—периферический край разреза мочевого пузыря.

ря не удалось. Дефект пузыря стянут четырьмя узловатыми кетгутовыми швами. На стянутый таким образом дефект наложен трансплантат плаценты илощадью 2 см3 и под ним слизистая оболочка влагалища зашита узловатыми кетгутовыми швами. Введен эластический катетер на 10 часов. Через указанный срок катетер вынут, больная стала мочиться самостоятельно.

На 7-й день поеле операции моча стала просачиваться во влагалище. Вместе с тем сохранилось и произвольное мочеиспускание. При осмотре зеркалами на месте бывшего дефекта видно небольшое отверстие 2-3 мм в диамет-

ре, из которого каплями вытекает моча.

11. VIII острой ложечкой произведено освежение краев свищевого отверстия, на которое наложен кусочек плаценты, прикрепленный слизистой двумя кетгутовыми швами. На 9-й день этот кусочек отпал и моча снова стала просачиваться во влагалище.

5. IX больная, по ее желанию, выписана со значительным улучшением. Ей было предложено явиться для осмотра через 2 месяца. Затем от нее были получены сведения, что просачивание мочи во влагалище прекратилось и мочевой пузырь функционирует нормально.

К. А., колхозница, 36 лет, поступила в клинику 7.XI. 1939 г. по поводу ис-

течения мочи через влагалище.

Первые менструации наступили на 17-м году жизни, наступали через месяц, длились 3 дня, необильные, с болями. Характер и тип менструаций с началом половой жизни не изменились. Половую жизнь начала в 17 лет. Последние месячные 30. Х. 1939 г. Вскоре после начала половой жизни вабеременела и родила недоношенного мертвого ребенка. 13 лет тому назад вторично рожала дома; роды затянулись, причем трое суток при роженице находилась повитуха и лишь на четвертые сутки был вызван врач, который констатировал поперечное положение, произвел поворот на ножку и, по словам больной, извлек плод. На следующий день моча начала вытекать непроизвольно через влагалище. Через три месяца после родов была произведена операция зашивания свища, но безрезультатно. После этого больная больше за помощью не обращалась. Беременной больше не была.

Больная среднего роста, правильного телосложения. Видимые слизистые оболочки розового цвета. Язык влажный, необложенный. Живот мягкий, безболезненный. Со стороны внутренних органов изменений не выявлено. Температура 36,5°, пульс 72 в минуту, хорошего наполнения, ритмичный.

Растительность на лобке по женскому типу. Резкое раздражение больших и малых губ, а также внутренней поверхности бедер. Половая щель зияет, из нее вытекает моча. На промежности значительных размеров белесоватый ру-

Внутреннее исследование: влагалище нормальной длины. Передняя стенка влагалища в средней и верхней трети в общирных рубцах. В переднем своде несколько влево определяется дефект пузырновлагалищной стенки, свободно пропускающий два пальца. Ощущается выпавшая из дефекта во влагалище слизистая мочевого пузыря. Шейка матки выражена плохо, с надрывами.

Бимануальное исследование: матка в ретрофлексии, немного увеличена, илотновата, подвижна. Придатки не определяются. Диагональная конъюгата

13 cm.

При осмотре зеркалами Симса на передней стенке влагалища несколько влево, на границе между верхней и средней третями обнаруживается дефект диаметром в 3 см. Из дефекта выпадает слизистая мочевого пузыря, которая со стороны слизистой влагалища охвачена кольцом рубцовых изменений. В левой части выпадающей слизистой на 2 мм от края ясно видно устье левого мочеточника. Из него струйкой вытекает моча. Края дефекта чистые.

Диагноз: пузырновлагалищная фистула.

Назначены сидячие ванны, места раздражения смазываются вазелином. Хромоцистоскопия: феномен справа на 6-й, слева на 8-й минуте, хорошей интенсивности. Свищ расположен на Литодиевом треугольнике, ближе к левому мочеточнику. Устье левого мочеточника отстоит на 2-3 мм от края свища.

Анализ мочи: количество 30 см³. Реакция щелочная. Цвет бледножелтый Удельный вес 1005. Белка и сахара нет. Лейкоцитов 1-2 в поле зрения. Эритроциты выщелоченные изредка. Плоский эпителий в значительном количестве,

триппельфосфаты—в умеренном. 11.XII под общим эфирным наркозом произведен крестообразный разрез по Атабекову. Дефект мочевого пузыря освобожден от рубцов. Отверстие на мочевом пузыре стянуто кисетным кетгутовым швом с заворачиванием краев внутрь пузыря. На место стянутого швом дефекта наложен трансплантат, который покрыт слизистой оболочкой влагалища. На слизистую влагалища наложены узловатые кетгутовые швы. Вставлен на 10 часов эластический катетер.

На 7-й день после операции моча стала просачиваться во влага лище.

4. 1. 1940 г. больная настояла на выписке из клиники.

Г. А., колхозница, 19 лет, поступила в клинику 6. ХІ. 1939 г. по поводу

истечения мочи через влагалище.

Первые менструации появились в 16 лет, наступали через месяц и продолжались 2-3 дня. Половую жизнь начала в 17 лет. С началом половой жизни тип и характер менструаций не изменились. Вскоре после начала половой жизни забеременела, рожала год тому назад в районной больнице. Затяжные роды кончились наложением щипнов, плод был извлечен мертвым. Вскоре после родоразрешения появилось истечение мочи через влагалище. Операция по поводу мочеполовой фистулы четыре месяца тому назад не дала эффекта. Менструаций не было с момента беременности; последние два месяца показывались капли крови.

Больная среднего роста, правильного телосложения. Видимые слизистые бледнорозового цвета. Язык влажный, необложенный. Живот мягкий, безболезненный. Со стороны внутренних органов отклонений от нормы не обнаружено. При ходьбе неправильная координация движений конечностей. Температура 36,7°, пульс 80 в минуту, удовлетворительного наполнения, ритмичный.

Растительность на лобке по женскому типу. Наружные половые органы развиты нормально. На внутренней поверхности бедер, а также на наружных гениталиях резкое раздражение. Половая щель открыта, из нее вытекает моча.

На промежности белесоватый рубец.

Внутреннее исследование: влагалище нормальной длины. На передней стенке его на 2 см от входа определяются рубец и дефект, пропускающий в мочевой пузырь палец. Шейка матки цилиндрической формы, наружный зев с надрывами, закрытый.

Бимануальное исследование: матка в антефлексии, атрофична, плотновата, подвижна. Боковые своды свободны, придатки не определяются. Диагональная

конъюгата 11 см.

При осмотре зеркалами Симса на передней стенке влагалища виден рубец. В области сфинктера мочевого пузыря и заднего отдела уретры имеется дефект 1 см в диаметре. Дефект в рубцах, края чистые.

Диагноз: уретро-пузырновлагалищная фистула.

Применены сидячие ванны, смазывание раздраженных мест вазелином. Хромоцистоскопия: передний пузырновлагалищный свищ с отрывом уре-

тры. Феномен справа и слева на 6-й минуте, хорошей интенсивности.

Анализ мочи: количество 100 см3. Реакция щелочная. Цвет желтый. Удельный вес 1020. Моча мутновата. Белка 0,033%. Лейкоцитов 80-100 в поле зрения. Плоский эпителий в большом количестве, тринпельфосфаты также.

2. XII под общим эфирным наркозом рассечена оторванная уретра. Дефект путем расщепления освобожден от рубцов. Уретра пятью кетгутовыми швами прикреплена к шейке мочевого пузыря, а в месте рассечения сшита также кетгутовыми узловатыми швами. Поверх сведенного швами дефекта пузыря с краями оторванной уретры, а также на место соединения краев рассеченной уретры наложен трансплантат плаценты площадью 2 см2 и покрыт слизистой оболочкой влагалища, на которую наложены кетгутовые швы. Вставлен эластический катетер на 10 часов.

Через указанный срок катетер был вынут, и больная стала мочиться самостоятельно. Послеоперационный период проходил гладко. Больная все время мочилась произвольно. На шестой день она встала с постели, но на следующий день пожаловалась на то, что при ходьбе протекает немного мочи.

17. ХІІ при осмотре зеркалами Симса на передней стенке влагалища виден свежий, хорошо заживший рубец. Моча не протекает. Далее больная хорошо

удерживает мочу и при ходьбе.

18. ХН выписана в хорошем состоянии, с восстановленной функцией мочевого пузыря и уретры.

Я. А., колхозница, 24 лет, поступила в акушерско-гинекологическую боль-

ницу 8. V. 1940 г. по поводу истечения мочи через влагалище. Первые менструации в 13 лет, каждые 28 дней, по 3 дня. Половую жизнь начала в 19 лет. Беременность была одна, закончилась срочными родами в 1937 г. При затяжных родах, потребовавших оперативного пособия, извлечен мертвый плод. Через три дня после родов появилось истечение мочи через влагалище. С момента образования свища и до настоящего времени пять раз подвергалась операции, но безрезультатно. Последние менструации 20. IV. 1940 г.

Больная ниже среднего роста, правильного телосложения. Видимые слизистые оболочки бледнорозовые, язык влажный, необложенный. Живот мягкий, безболезненный. Со стороны внутренних органов изменений не обнаружено. Температура 36,10, пульс 76 в минуту, хорошего наполнения, ритмичный Растительность на лобке по женскому типу. Наружные половые органы развиты нормально. Половая щель зияет. На промежности белесоватый рубец. Из влагалища вытекает моча.

Внутреннее исследование: влагалище укорочено, в плотных рубцах. На передней его стенке ощущается желобоватый ход, причем по ходу этого желоба палец проникает непосредственно в мочевой пузырь. Ниже отверстия определяется другое, пропускающее кончик пальца. Шейка матки не контури-

руется.

Вимануальное исследование: тело матки отклонено кзади, фиксировано. Своды не выражены, придатки не определяются. Диагональная конъюгата 11.

Осмотр зеркалами Симса: шейка матки деформирована. Несколько выше в переднем своде видно свищевое отверстие диаметром до 1 см. Второе отверстие непосредственно примыкает к разрушенной на всем своем протяжении уретре. Имеются лишь остатки задней стенки уретры.

Диагноз: пузырновлагалищная фистула и полное разрушение уретры. Назначены смазывания раздраженных мест вазелином, сидячие ванны.

Анализ мочи: количество 30 см³. Реакция щелочная. Удельный вес 1015. Цвет соломенно-желтый. Моча мутновата. Лейкоцитов 15—25 в поле зрения. Эритроцитов измененных 5-6 в поле зрения. Белка 0,02% Сахара нет. Цилинд-

ры единичные. Плоский эпителий и слизь в значительном количестве.

17. V под общим эфирным наркозом произведено расщепление слизистой оболочки влагалища и стенки мочевого пузыря. Вследствие значительных рубцовых изменений добиться подвижности пузыря невозможно. Свищевое отверстие стянуто двумя кетгутовыми узловатыми швами и на него наложен трансплантат плаценты, который закрыт слизистой влагалища. Из слизистой влагалища, отсепарованной от шейки мочевого пузыря, выкроен лоскут для образования уретры по Отту. Созданная таким образом уретральная трубка соединена с шейкой мочевого пузыря. На место соединения краев новообразованной уретры наложен трансплантат толщиною в 1 мм на всем протяжении синтой трубки. Этот трансплантат покрыт слизистой оболочкой влагалища. Вставлен эластический категер.

В послеоперационном периоде в течение суток моча вытекала через катетер. На вторые сутки он был вынут, и больная стала мочиться самостоятельно. Отмечалось очень частое моченспускание. На 6-й день больная стала ощущать, что моча протекает во влагалище, но произвольное моченспускание еще было сохранено. С каждым днем просачивание мочи во влагалище усиливалось.

Через две недели после операции при осмотре зеркалами Симса бывшее свищевое отверстие ниже щейки мочевого пузыря найдено зарубцевавшимся. Что же касается искусственно созданной уретры, то сшитая из слизистой влагалища трубка разошлась в передней трети.

Л. А., работница маслозавода, 38 лет, поступила в клинику 19. V. 1940 г.

по поводу истечения мочи через влагалище.

Первые менструации на 16-м году, через месяц, по 4—5 дней. Половую жизнь начала в 23 года. Все четыре беременности доносила до конца. Последние роды два года тому назад закончились наложением щипцов в районной больнице. Через несколько дней после операции появилось истечение мочи через влагалище. В сентябре 1938 г. больная подверглась операции зашивания свища в районной больнице, но безрезультатно.

Больная среднего роста, правильного телосложения. Видимые слизистые оболочки розовы. Со стороны внутренних органов отклонений от нормы не обнаружено. Живот мягкий, безболезненный. Температура 36,7°, пульс 80 в минуту, удовлетворительного наполнения, ритмичный. Растительность на лобке по женскому типу. Большие и малые срамные губы развиты нормально. Поло-

вая щель приоткрыта, из нее вытекает моча.

Внутреннее исследование: щейка матки деформирована. Слева на передней стенке влагалища определяется отверстие с рубцовоизмененными краями, про-

пускающее палец.

Бимануальное исследование: матка в ретрофлексии, сграниченно подвижна, не увеличена, плотна. Своды свободны, придатки не определяются. На исследующих пальцах остается кровь. Диагональная коньюгата 13 см.

Осмотр зеркалами Симса: в переднем своде несколько влево от середины

виден пузырновлагалищный свищ в рубцовых сращениях.

Хромоцистоскопия: феномен с обеих сторон на 6-й минуте, хорошей интенсивности. Свищ диаметром в 1 см расположен слева и спереди от устья левого мочеточника. Устье мочеточника отстоит от края свища на 3—4 мм.

Анализ мочи: количество 50 см³. Реакция щелочная. Цвет бледно-желтый с кровавым оттенком. Удельный вес 1015. Белка 1% Эритроцитов свежих 100—120 в поле эрения, лейкоцитов—30—40. Плоский эпителий, слизь и триппель-

фосфаты в значительном количестве.

21. V под эфирным наркозом произведена фистулорафия. Сделан крестообразный разрез по Атабекову. Слизистую влагалища отсепарировать полностью от мочевого пузыря не удалось. Свищевое отверстие мочевого пузыря стянуто тремя узловатыми кетгутовыми швами и поверх него непосредственно на стенку мочевого пузыря наложен трансплантат плаценты. На слизистую влагалища, покрывающую трансплантат, наложены узловатые кетгутовые швы. Вставлен эластический катетер на 10 часов.

После указанного срока катетер вынут, и больная стала мочиться самостоятельно. Послеоперационный период прошел гладко. С момента извлечения катетера больная все время мочилась произвольно. Встала на 6-й день после

операции. Мочу удерживала хорошо.

5. VI осмотр зеркалами Симса: свищевое отверстие зарубцевалось. Выписана в хорошем состоянии с восстановленной функцией мочевого пузыря.

Мы видим, что вторая группа страдавших мочеполовыми свищами (10 человек) включает больных, которые до поступления в клинику подвергались операции зашивания свища, но безрезультатно. Отдельные больные перенесли 5—7 вмешательств. В этой группе больных в 5 случаях были пузырновлагалищные свищи, в 3—уретро-пузырновлагалищные, в одном—мочеточниково-пузырновлагалищный и в одном пузырновлагалищный свищ в комбинации с полным разрушением уретры.

Давность существования свищей: до одного года—1 случай, от 1 до 2 лет—5, до 3 лет—1, до 5 лет—2 и до 13 лет—1.

Из 10 больных 8 поступили в клинику с явлениями значительного раздражения наружных половых органов и смежных частей; эти больные до операции подвергались консервативному лечению.

Реакция мочи у большинства больных была щелочной, в 2 слу-

чаях-кислой и в одном-слабо кислой.

В четырех случаях, применив плацентарный трансплантат как заплатку для закрытия свищей с предварительным освежением его краев, мы только в одном случае пузырновлагалищного свища незначительного размера получили полное излечение после первой операции; в трех других случаях, в одном из которых был мочеточниково-пузырновлагалищный свищ, при освежении краев давший значительное кровотечение, а в двух—уретро-пузырновлагалищный свищ, от применения этого метода положительного результата не достигнуто, несмотря на двух- и трехкратное подшивание заплатки из плаценты.

У 5 страдавших мочеполовыми свищами мы при операции предварительно производили отсепаровку стенки влагалища от стенки мочевого пузыря. Освободив таким образом мочевой пузырь от рубцов и отделив от стенки влагалища, мы сводили края свищевого отверстия кетгутовыми швами, а затем непосредственно на стенку мочевого пузыря в области свища накладывали трансплантат плаценты. Слизистая оболочка влагалища зашивалась узловатыми кетгутовыми швами. Таким образом, трансплантат помещался между стенкой пузыря и стенкой влагалища.

По этому методу нами оперированы три женщины с пузырновлагалищными свищами, одна—с уретро-пузырновлагалищным свищом и одна—с комбинацией пузырновлагалищного свища и полного разрушения уретры. В этом комбинированном случае мы, помимо закрытия пузырновлагалищного свища по приведенному выше способу, дополнили операцию созданием уретры из слизистой оболочки влагалища. На место соединения краев уретральной трубки, а также у сфинктера мочевого пузыря мы наложили тонкий плацентарный трансплантат (толщина его не превышала 1 мм).

В результате операции у 3 из этих 5 женщин свищевые отверстия зажили; в одном из этих случаев был уретро-пузырновлагалищный свищ, причем в одном из них кроме того была разрушена уретра; созданная нами

уретра в передней трети не срослась.

В остальных случаях полного излечения после первой операции не наступило. Одна больная со свищом 13-летней давности, с большими рубцовыми изменениями и со значительным пролабированием слизистой мочевого пузыря выписалась, к сожалению, без нашего осмотра. Это лишило нас возможности установить, какое влияние оказал трансплантат на свищевое отверстие.

Другая больная, у которой свищевое отверстие сразу не закрылось полностью, была осмотрена зеркалами. Оказалось, что свищевое отверстие у нее под влиянием трансплантата резко уменьшилось. Это значительное уменьшение свищевого отверстия способствовало частичному восстановлению произвольного мочеиспускания. Спустя некоторое время, больной было произведено освежение краев свищевого отверстия и подшивание кусочков плаценты. На 7-й день после этого больная почувствовала просачивание мочи, однако произвольное мочеиспускание сохранялось. Перед выпиской при осмотре зеркалами выявлено бурное разрастание грануляционной ткани вокруг свищевого отверстия. Через 2 месяца больная сообщила, что протекание мочи во влагалище прекратилось и функция мочевого пузыря восстановилась полностью.

Двое больных с уретро-пузырновлагалищным свищом, которым несколько раз безрезультатно подшивался кусочек плаценты в виде заплатки, были затем также оперированы по только что описанному методу. В одном из этих случаев наступило излечение, а в другом—свищевое отверстие настолько уменьшилось, что больная стала полностью удерживать мочу, и лишь при произвольном мочеиспускании незначительная часть мочи

просачивалась во влагалище.

Наконец, в одном из 10 разбираемых случаев пузырновлагалищного свища со значительным диаметром и при расположении устьев мочеточников у самого края свищевого отверстия мы применили метод расщепления стенки влагалища и стенки мочевого пузыря, затем Z-образным кетгутовым швом стянули свищевое отверстие и зашили слизистую оболочку влагалища узловатыми кетгутовыми швами. На зашитую слизистую влагалища соответственно расположению свища в поперечном направлении был наложен трансплантат плаценты, прикрепленный к слизистой

четырьмя кетгутовыми швами.

В результате операции по этому способу свищ резко уменьшился и даже частично наступило произвольное мочеиспускание, но все же полного излечения не достигнуто. Этот метод мы выбрали потому, что наложение трансплантата непосредственно на стенку мочевого пузыря, по нашему мнению, могло бы повести к закрытию устьев мочеточника. Не получив полного эффекта, мы дважды прибегали к освежению краев свищевого отверстия и подшиванию кусочка плаценты, но безрезультатно. В четвертый раз, учитывая настойчивое желание больной избавиться от свища, мы решили произвести широкую отсепаровку стенки влагалища от стенки мочевого пузыря, стягивание свишевого отверстия Z-образным кетгутовым швом и наложение плацентарного трансплантата непосредственно на стенку мочевого пузыря. После наложения трансплантата мы закрыли слизистую оболочку влагалища узловатыми кетгутовыми швами; таким образом, плацентарный трансплантат оказался между стенкой

мочевого пузыря и стенкой влагалища. В результате операции плацентарный трансплантат, действительно, закрыл устья мочеточников, попавших в рубец. Вследствие этого через 48 часов после операции мы вынуждены были распустить швы и удалить трансилантат (добытый трансплантат был подвергнут гистологическому исследованию, причем установлено, что плацентарная ткань не подвергалась изменениям).

Таким образом, в этой группе больных в 4 случаях из 10 наступило заживление свищевых отверстий после нашей первой операции (если не считать случай, в котором нам не удалось полностью восстановить уретру). В 2 случаях нам удалось добиться закрытия свищевого отверстия после повторных операций. Следовательно, в 6 случаях из 10 достигнуто полное из-

лечение.

Из остальных 4 случаев в одном наступило значительное улучшение, два оказались безрезультатными, а в одном нам не

удалось до конца проследить за больной.

Анализируя результаты 17 случаев хирургического лечения мочеполовых свищей с применением плацентарной ткани (по трем приведенным нами модификациям), мы должны отметить полный успех у всех 7 больных, которые до поступления в клинику ни разу не подвергались операции зашивания свища. В группе больных, которые до поступления в клинику подвергались операциям, положительный результат достигался не всегда, при-

чем редко после первого нашего вмешательства.

Применяя метод освежения краев свищевого отверстия с последующим наложением на свищ трансплантата плаценты, мы убедились в том, что этот метод целесообразно применять лишь при свищах незначительного размера. Плацентарный трансплантат, вызывая мощное разрастание грануляционной ткани, способствует рубцеванию таких свищей. Однако этот метод, как мы видим, не всегда является надежным, особенно в тех случаях, когда больные уже подвергались операции. Во всяком случае этот метод можно испробовать без всякого риска для больной, так как он, являясь чрезвычайно простым и доступным даже для начинающего хирурга, вместе с тем никогда не ухудщает состояния свища, не увеличивает его размеров. Наоборот, плацентарная ткань благоприятно влияет на те рубцовые изменения, которые всегда имеются вокруг свища, а мощное разрастание грануляционной ткани под влиянием трансплантата не исключает возможности его заживления.

Второй примененный нами метод—расщепление стенки влагалища и стенки мочевого пузыря с использованием разрезов Атабекова, последующим соединением краев свищевого отверстия кетгутовым швом, наложением трансплантата непосредственно на стенку мочевого пузыря на месте свища и зашиванием слизистой влагалища, закрывающей трансплантат,—является, с нашей точки зрения, наиболее эффективным. При этом методе трансплантат прочно и быстро соединяется с подлежащей тканью мочевого пузыря. Он является как бы барьером между стенкой последнего и стенкой влагалища, который не пропускает мочи. Больная свободно удерживает мочу; сразу же после операции

восстанавливается произвольное мочеиспускание.

Введение эластического катетера на 10 часов после операции мы считаем необходимым для того, чтобы стало возможным прочное слипание трансплантата со стенкой мочевого пузыря и чтобы подшитый кусочек плаценты не подвергался в первые часы воздействию мочи, так как свищевое отверстие мы не сшиваем, а только сводим швами его края; при таком положении остаются значительные щели, через которые моча свободно могла бы действовать на трансплантат. Когда трансплантат приходит в тесное соприкосновение со стенкой мочевого пузыря и прочно с ней соединяется, катетер становится уже ненужным.

Трансплантат плаценты вызывает мощное разрастание грануляционной ткани, что влечет за собой успешное рубцевание

свищевого отверстия.

Этот метод является более сложным, так как требует отсепаровки стенки влагалища от стенки мочевого пузыря. Во всяком
случае, если такая отсепаровка встречает затруднение, то не
следует добиваться во что бы то ни стало полной подвижности
мочевого пузыря. Наша практика показала, что плацентарная
ткань и в таких случаях способствует успешному заживлению
свища.

Третий метод—подшивание плацентарного трансплантата к слизистой оболочке влагалища после соединения краев свища и зашивания слизистой—мы применили только один раз. В этом случае мы не добились полного излечения, но все же свищ у больной значительно уменьшился; с уменьшением свищевого отверстия частично восстановилось произвольное мочеиспускание.

Конечно, из этого одного случая нельзя сделать какого-либо определенного вывода. Полагаем, что в подобных приведенному случаях целесообразно применить этод метод. В других случаях, когда нет опасности закрытия трансплантатом устья мочеточника, лучше накладывать трансплантат непосредственно на стенку

мочевого пузыря.

Отдельные неудачи применения трансплантата у женщин, до этого подвергавшихся операциям, с нашей точки зрения, еще не говорят о том, что плацентарная ткань не является стимулятором, способствующим заживлению свищей. Эти неудачи скорее можно отнести за счет неудачного выбора метода применения плацентарной ткани в качестве свободного трансплантата. Мы полагаем, что дальнейшее совершенствование техники увеличит число случаев заживления свища после первой же операции и у таких больных.

Особенного внимания заслуживает то обстоятельство, что даже при неудаче наш метод не влечет за собой ухудшения

состояния. Свищевое отверстие не только не увеличивается, как это бывает при неудачных обычных фистулорафиях, а, наоборот, всегда уменьшается. Кроме того, плацентарный трансплантат чрезвычайно благоприятно влияет на состояние рубца, в чем мы убедились при повторных операциях.

В некоторых случаях после наших операций возник пиелонефрит. Это осложнение появилось в тех случаях, когда свищевые отверстия были покрыты налетом и изъязвлены. Надо полагать, что у этих больных до операции мы не сумели окончательно ликвидировать очаги инфекции. В большинстве случаев у наших больных реакция мочи оказывалась щелочной, но мы все же приступали к оперативному вмешательству. Хотя эти осложнения и не повлияли на заживление свищей, мы все же считем оперативное вмешательство в этих случаях ошибкой. Консервативное лечение таких больных должно проводиться не только до момента исчезновения налетов вокруг свища, но необходимо добиваться также к моменту операции хотя бы слабо кислой реакции мочи. Из этого, однако, не следует, что больную с мочеполовым свищом, у которой при поступлении в клинику реакция мочи щелочная, но края свищевого отверстия чисты, нельзя подвергать операции по нашему методу. Опыт показывает, что при чистых краях свищевого отверстия в послеоперационном периоде не было никаких осложнений.

Поэтому, чтобы повысить оборачиваемость койки в лечебном учреждении и не заставлять томиться больных, всегда с нетерпением ожидающих избавления от этого тяжелого недуга, необходимо каждый случай иидивидуализировать. Если свищ покрыт налетами и изъязвлениями, то перед операцией, помимо анализа мочи и посева, необходимо также производить исследование крови на лейкоцитоз и ставить РОЭ. Мы полагаем, что эти исследования помогут установить показания к операции и, благодаря этому, удастся в большей части случаев избегнуть нежелательных осложнений.

Оперируя в течение ряда лет по методу расшепления, о чем уже говорилось ранее, мы не получали удовлетворительных результатов. Большая литература, посвященная этому вопросу, также не является в этом отношении оптимистической. Из 17 женщин, оперированных по нашему методу, 10 до поступления в клинику подвергались безрезультатным вмешательствам. Это также говорит о том, что существовавшие методы далеки от совершенства.

Результаты хирургического лечения свищей с применением плацентарной ткани убеждают нас в том, что этот метод является более простым и эффективным.

Особенное внимание должно быть обращено на достижение излечения после первой же операции, так как с каждым последующим вмешательством при обычной фистулорафии шансы на

успех становятся все меньше, и часто размеры свища при даль-

нейших попытках оперирования увеличиваются.

Наш метод операции, примененный у 7 больных, которые до поступления в клинику не подвергались оперативному вмешательству, привел к полному излечению после первой же операции. В тех случаях, когда больные были уже ранее подвергнуты операции, мы получили ободряющие результаты.

Мы считаем возможным предложить этот метод для широкой проверки и внедрения в практику. Несомненно, дальнейшее усовершенствование и развитие техники способа даст еще лучшие

результаты.

В доступной литературе мы не нашли указаний на то, чтобы плацентарная ткань использовалась кем-нибудь в качестве свободного трансплантата для лечения мочеполовых свищей у

женщин.

Арчаков производил автотрансилантацию илаценты женщинам с целью получения у них гормональной стерилизации. 20 женщинам он сделал пересадку плацентарной ткани (от 1 до 8 г), полученной от них же при производстве аборта. Ткань плаценты помещалась под апоневроз брюшной стенки с левой стороны. Арчаков утверждает, что он получал у этих женщин временный стерилитет различной длительности (в зависимости от количества трансплантированной ткани плаценты). Никаких осложнений от этих пересадок автор не отмечал. Он указывает на улучшение аппетита, общего самочувствия и даже прибавление в весе у этих женщин.

Мы также не можем отметить каких-либо вредных влияний плацентарного трансплантата на организм женщин, у которых мы применяли его для лечения свищей. Что же касается временного стерилитета, который по утверждению Арчакова, вызывается действием плацентарной ткани, то он в данных случаях может оказаться лишь чрезвычайно благоприятным совпадением, ибо только будет способствовать укреплению рубца

на месте бывшего свищевого отверстия.

Принимая во внимание новизну нашего метода, мы предприняли экспериментальную проверку. Экспериментальные данные Третьякова, который производил пересадку плаценты человека на свежие искусственно созданные дефекты кишечника у кроликов, нас удовлетворить не могли. Мы считали необходимым провести такие эксперименты, которые приблизили бы нас к действительности, чтобы на основании этих опытов можно было бы сделать определенные теоретические и практические выводы.

IV. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Образование искусственных пузырновлагалищных свищей у собак и их хирургическое лечение с применением плацентарной ткани. Макро- и микроскопические исследования

Мы задались целью изучить на животных, как происходит у них заживление пузырновлагалищных свищей под влиянием гомогенного трансплантата, а также какова судьба трансплантата.

Для того, чтобы более или менее правильно подойти к разрешению поставленной задачи, нам необходимо было прежде всего создать экспериментально такой свищ, который был бы подобен встречающемуся в качестве послеродового осложнения. Мы считали, что этому будет соответствовать свищ, при котором нарушенная стенка мочевого пузыря животного тесно спаяна с нарушенной стенкой влагалища, причем этот свищ некоторое

время функционирует.

Искусственный пузырновлагалищный свищ у собаки-самки мы создавали следующим образом: под наркозом, преимущественно морфийным, по средней линии к симфизу послойно вскрывалась брюшная стенка. Сейчас же выше симфиза обнаруживался мочевой пузырь, в большинстве случаев наполненный мочой. Опорожнение пузыря от мочи производилось при помощи массажа. Опорожненный мочевой пузырь мы приподнимали и отыскивали влагалище и матку. Определив направление влагалища и его переднюю стенку, мы соединяли последнюю с задней стенкой мочевого пузыря, ближе к его дну, при помощи непрерывного тонкого шелкового шва, накладываемого в поперечном или косом направлении по отношению к влагалищу и мочевому пузырю. При этом мы старались, чтобы шов не проникал как через слизистую оболочку влагалища, так и через слизистую мочевого пузыря (рис. 6).

После того, как мочевой пузырь и влагалище были соединены, мы отступив на 1½ мм от шва, делали скальпелем разрез как на мочевом пузыре, так и на стенке влагалища (через всю их толщу). Длина этого разреза и его направление соответствовали наложенному шву (рис. 7). Край разреза мочевого пузыря,

лежащий ближе к шву, мы соединяли с таким же краем разреза влагалища обвивным щвом из тонкого шелка (рис. 8), а периферические края разрезов также соединяли непрерывным тонким шелковым швом (рис. 9).

На соединение периферических краев разрезов обращалось особое внимание: необходимо было это соединение произвести настолько тщательно, чтобы не оставалось щелей, через которые

совершалось бы просачивание мочи в брюшную полость.

Таким образом мы создавали анастомоз между мочевым пузырем и влагалищем. После проверки тщательности наложения анастомоза, брюшная полость послойно закрывалась наглухо. На брюшину накладывался непрерывный кетгутовый шов, на апоневроз— непрерывный шелковый, а на кожу— узловатые шелковые.

Здесь следует отметить, что для наших экспериментов мы старались по возможности подбирать уже рожавших самок, так как у нерожавших влагалищная трубка более узка и тонко-

стенна.

При производстве операции мы придерживались всех правил хирургической техники, а также соответствующей асептики и антисептики.

Оперированные собаки помещались в отдельные клетки и подвергались ежедневному наблюдению. Обращалось внимание на их общее состояние и особенно на функционирование искусственного пузырновлагалищного свища. У всех оперированных нами собак свищи функционировали, о чем свидетельствовало постоянное непроизвольное истечение мочи через влагалище. Длительность наблюдения над этими собаками была: минимальная 10 и максимальная—43 дня. Этот срок нам казался вполне достаточным для того, чтобы вокруг анастомоза образовались мощные спайки и края свища в мочевом пузыре оказались рубцовоизмененными.

Всего оперировано по выработанному нами методу 14 собаксамок, из которых погибло 5. Одно животное погибло, повидимому, от наркоза, а остальные—на 4-й день после операции от перитонита, что подтверждено на вскрытии.

Убедившись в том, что свищ у выживших животных функционирует, что животное приспособилось к новым условиям своего состояния и является относительно здоровым, мы в тот или другой срок после первой операции предпринимали вторую — закрытие пузырновлагалищного свища.

Брюшная полость вскрывалась по ходу старого рубца с иссечением последнего. Анастомоз между мочевым пузырем и влагалищем, оказывавшийся довольно прочным, рассекался скальпелем или ножницами, а в местах, где соединение было рыхлым, расслаивался пальцем. В результате влагалище полностью отделялость от мочевого пузыря. Каждый из этих органов имел свищевое отверстие диаметром от 8 до 12 мм.

Края свищевых отверстий были неровными, с папилломатозными разрастаниями, местами плотноватыми, втянутыми. Часто при разрушении анастомоза можно было видеть отложение мочевых солей по краям свища. Вообще искусственный свищ у животного весьма напоминал свищи, образующиеся в результате повреждений влагалища и мочевого пузыря у женщин при патологических родах.

Далее, свищевое отверстие во влагалище закрывалось узловатыми шелковыми или кетгутовыми швами, а на свищевое отверстие мочевого пузыря накладывался кусочек гомогенной свежей плаценты, который не только покрывал отверстие, но и выходил за его края на расстояние до 5 мм. Этот кусочек плаценты прикреплялся четырымя узловатыми кетгутовыми швами, причем перед наложением плацентарного трансплантанта поверхность стенки мочевого пузыря не освежалась. По окончании операции

брюшная полость послойно закрывалась наглухо.

Гомопластическая плацента добывалась непосредственно перед операцией путем производства кесарского сечения собаке в момент наступления родов. Из плаценты вырезывался ножницами кусочек, достаточный для закрытия свищевого отверстия в мочевом пузыре; толщина трансплантата—2—2,5 мм. С материнской поверхности используемого кусочка плаценты острой бритвой снимался поверхностный слой, затем трансплантат ополаскивался физиологическим раствором хлористого натрия и прикладывался срезанной поверхностью к дефекту в мочевом пузыре. Края свищевого хода при этом не сближались и не освежались, кусочек плаценты только прикрывал отверстие свища; чтобы трансплантат не отпал, мы укрепляли его четырьмя кетгутовыми швами.

Двум животным с искусственным пузырновлагалищным свищом пересадка плаценты не производилась. Им при вторичной операции после разделения свища влагалища и свища мочевого пузыря отверстия в обоих органах были закрыты наглухо узловатыми шелковыми швами. Эти животные служили контролем.

Приведем некоторые протоколы опытов, иллюстрирующие

весь ход экспериментальных работ.

Протокол № 1. Сука "Тереза", весом 8100 г, оперирована 26. V. 1939 г. Под хлороформным наркозом по средней линии к лобку вскрыта брюшная полость. Мочевой пузырь найден растянутым мочой. Моча удалена посредством массажа пузыря. По выработанной нами методике образован пузырновлагалищный свищ диаметром до 8 мм. После проверки анастомоза брюшная полость послойно закрыта наглухо. К концу операции у собаки наступила асфиксия. Искусственное дыхание не дало результатов. Вскоре после окончания операции собака погибла от паралича сердца.

Протокол № 2. Сука "Дези", весом 8600 г, оперирована 31. V. 1939 г. Для наркоза применен 5% раствор морфия в количестве 3 см³. По средней линии в направлении к лобку вскрыта брюшная полость. Мочевой пузырь наполнен мочой. Моча удалена посредством массажа пузыря. Методика операции та же. Образован пузырновлагалищный свищ диаметром до 10 мм. После проверки тщательности наложения анастомоза брюшная полость закрыта наглухо. После

окончания операции животное вскоре проснулось.

1. VI. Моча вытекает непроизвольно через влагалище. Хвост и задние ноги

животного мокрые. Животное вяло, не ест и только пьет воду.
2. VI. Состояние животного тяжелое. Глаза мутные. Не ест. Слабо реагирует на окружающее. Моча вытекает непроизвольно через влагалище. Живот несколько вздут.

3. VI. Состояние такое же. Живот вздулся еще больше. Животное лежит

без движения с резко помутневшими глазами. 4. VI. Животное погибло от перитонита.

Следующие три собаки погибли от перитонита в различные сроки после операции. До гибели свищ у всех функционировал.

Мы установили далее, что для наркоза собак наиболее выгодным является применение 5% раствора морфия в количестве от 2 до 5 см³. Если доза морфия в процессе операции оказывается недостаточной, то лучше всего дополнить наркоз повторным впрыскиванием раствора морфия или эфирным ингаляционным наркозом. Примененный нами в одном случае хлороформ повел к гибели животного.

Нам все же удалось разрешить вопрос образования искусственного пузырновлагалищного свища. Кроме того, первые опыты показали, насколько тщательно нужно накладывать анастомоз между мочевым пузырем и влагалищем, обращая особенное внимание на соединение периферических краев. Четыре собаки погибли от перитонита, развившегося, повидимому, вследствие просачивания мочи в брюшную полость.

Протокол № 8. Собака "Хитрая", весом 18100 г. оперирована 13. VII. 1939 г. Для наркоза применен 5% раствор морфия в количестве 5 см3, дополненный затем эфирным наркозом, так как животное реагировало на вмешательство. По средней линии в направлении к лобку послойно вскрыта брюшная полость. Мочевой пузырь наполнен мочой. Путем массажа пузыря моча удалена. По принятой нами методике образован искусственный пузырновлагалищный свищ до 12 мм в диаметре. После тщательной проверки брюшная полость закрыта наглухо. На брюшину и апоневроз наложены непрерывные шелковые, а на кожу узловатые швы. После окончания операции собака еще некоторое время находилась в бессознательном состоянии, а затем проснулась и была помещена в клетку.

На следующий день после операции собака чувствовала себя удовлетворительно, поднималась на ноги, принимала пищу и питье, корошо резгировала на окружающее. Пузырновлагалищный свищ функционировал: моча не-

произвольно вытекала через влагалище.

В последующие дни животное с каждым днем чувствовало себя лучше, становилось бодрее и веселее, охотно принимало пищу и питье. Пузырновла-

галищный свищ функционировал. Швы зажили вторичным натяжением.

На 10-й день после первой операции произведена вторая лааротомия. Старый кожный рубец был вырезан до апоневроза, а затем послойно вскрыта брюшная полость, отодвинут кверху сальник и обнажен мочевой пузырь. На месте соединения задней стенки мочевого пузыря и передней стенки влагалища образовались хорошие спайки. Они разрезаны скальпелем и таким образом мочевой пузырь отделен от влагалища. В мочевом пузыре и во влагалище широкие свищевые отверстия диаметром до 12 мм. Края отверстия на мочевом пузыре утолщены. Из мочевого пузыря при надавливании показывается моча.

Приготовлен лоскут гомогенной плаценты площадью 3×4 см и толщиной до 2 мм. Освеженной поверхностью лоскут наложен на свищевое отверстие без сближения краев последнего и прикреплен четырымя кетгутовыми швами к серозной поверхности мочевого пузыря. Отверстие во влагалище закрыто наглухо узловатыми шелковыми швами. Влагалище и мочевой пузырь погруже-

ны и брюшная полость закрыта наглухо.

Операцию животное перенесло тяжело: несколько раз наступал цианоз, после операции долго не возвращалось сознание. Через сутки животное погибло.

В этом случае трансплантат закрывал свищ в течение суток. При вскрытии брюшной полости никаких особенных изменений не оказалось. Плацентарный трансплантат сохранился полностью (рис. 10). На нем фиксирован сальник; он легко отделен от трансплантата. Кетгутовые швы, которыми прикреплен трансплантат, выделяются ясно. Поверхность трансплантата слегка шероховата. Края его выступают над серозной поверхностью мочевого пузыря. В мочевом пузыре имеется моча.

Мочевой пузырь вместе с трансплантатом вырезан для исследования. Трансплантат плотно закрывает свищевое отверстие в мочевом пузыре, слипание его со стенкой мочевого пузыря со всех сторон, повидимому, значительно. При попытке приподнять край трансплантата последний отделяется от подлежащей ткани

с некоторым затруднением.

При рассматривании вырезанного препарата мочевого пузыря со стороны слизистой видна нерезко выраженная складчатость. У места свищевого отверстия выявляется кратерообразное углубление слизистой с радиарно расположенными складочками. Дном углубления является трансплантат. Края свищевого отверстия над трансплантатом отстоят друг от друга на 2—3 миллиметра, по-

верхность их неровна (рис. 11).

Из стенки мочевого пузыря приготовлены микропрепараты. Под лупой видна стенка мочевого пузыря с ее характерным строением. Трансплантат с наружной стороны плотно соединен со стенкой мочевого пузыря. Ткань плаценты утратила свое компактное строение, стала дырчатой, в ней сохранены стенки крупных сосудов. Плацентарная ткань окрашена менее интенсивно, чем ткань стенки мочевого пузыря, и, повидимому, пребывает в состоянии некробноза. У места соединения плаценты с наружной стенкой мочевого пузыря видна интенсивно окрашенная в красный цвет (эозин) узенькая полоска. За этой полоской следует полоса плацентарной ткани с синеватой окраской, вероятно, благодаря наличию инфильтрата из клеточных элементов с ядрами. Слизистая мочевого пузыря местами лишена эпителиального слоя. В подслизистой местами обнаруживается отек, местами имеются кистозные полости различной величины.

Микроскопически слизистая мочевого пузыря местами лишена эпителия. Подслизистая имеет складчатое строение, богата коллагенной и эластической тканью с тонкостенными сосудами. Типіса ргоргіа и подслизистая без резкой границы переходят в мышеч-

ный слой.

Мышечные пучки идут в различных направлениях и хорошо отграничены друг от друга прослойками соединительной ткани перимизия. Мышечные клетки хорошо контурируются, ядра отчетливо окрашены. Окружающая мышечный слой соединительная ткань сохранена полностью; на ней расположена ткань плаценты. Плацента утратила свое типичное строение: ворсинки отличить невозможно, ткань их мутна; сохранены лишь контуры крупных сосудов с их эластической и коллагенной тканью со слабо окрашенными ядрами.

Трансплантат с подлежащей соединительной тканью мочевого пузыря соединен фиброзной прослойкой. Фиброзные нити исходят из соединительной ткани мочевого пузыря, распространяясь

в ткань плаценты (рис. 12).

В соединительной ткани мочевого пузыря и в плацентарной ткани на месте их соприкосновения имеется резкая мелкоклеточная инфильтрация, состоящая из лимфоцитов, плазматических клеток, эозинофилов, полибластов и других клеточных элементов, преимущественно клеток пролиферата. Количество лей-

коцитов-полинуклеаров весьма незначительно (рис. 13).

Размножение клеток пролиферата весьма интенсивно. Сосуды соединительнотканного слоя мочевого пузыря расширены, переполнены кровью; в стенке сосудов отмечается размножение эвдотелия капилляров. Вокруг сосудов инфильтрат в виде муфт. Весь соединительнотканный слой мочевого пузыря заметно отечный, богатый сосудами, инфильтрированный клетками пролиферата. Эти же клетки в большом количестве расположены в ткани плаценты, они проникают в нее через фибринозную прослойку. Иногда вновь образованных клеток так много, что граница между плацентной и соединительной тканями сглажена. Гистиоцитарные элементы заполняют плацентарную ткань у места соприкосновения ее с серозной поверхностью мочевого пузыря.

Таким образом, плацента, повидимому, служит заметным стимулятором образования молодой грануляционной ткани. Стимул к росту ткани наблюдается не только в соединительнотканном наружном слое мочевого пузыря, но и в перимизии мышечных слоев, где также можно видеть пролиферативную реакцию, особенно в сосудах и около них. Экссудативное воспаление наблюдается лишь местами, причем оно весьма незначительно (рис. 14

и 15).

Мы видим, таким образом, что плацентарная ткань быстро подвергается некробиозу, однако она вызывает энергичную местную пролиферацию в соединительнотканном слое мочевого пузыря у места соприкосновения. Некротизирующаяся плацента заменяется вновь образующейся грануляционной тканью. Отсутствует экссудативное воспаление. Рост и образование новой ткани происходит преимущественно за счет мезенхимальной ткани, за счет разрастания соединительнотканных элементов, а также за счет эндотелия и перителия. Наличие в пролиферате лимфоцитов, моноцитов, эозинофилов говорит не только о местной реакции ткани, но и об образовании клеточных элементов вдали




Рис. 10. Стенка мочевого пузыря собаки со стороны серозной поверхности через сутки после наложения трансплантата. А—трансплантат плаценты; В—кетгутовые швы.



Рис. 11. Стенка мочевого пузыря со стороны слизистой через сутки после наложения трансплантата.

А—свищевое отверстие, закрытое трансплантатом; В—радиарная складчатость у свищевого отверстия.



Рис. 12. Микрофотограмма. Малое увеличение. Место сращения трансплантата со стенкой мочевого пузыря.

А-мочечой пузырь; В -трансплантат; С-места сращения фиброзная спайка.




Рис. 13. Микрофотограмма. Среднее увеличение. Место срашения трансплантата со стенкой мочевого пузыря. А-мочевой пузырь; В-трансплантат плаценты; С-место сращения фибринозная прослойка.




Рис. 14. Микрофотограмма. Среднее увеличение. Грануляционное воспаление в перимизии вблизи трансплантата. А-мышцы; Б-перимизий; С-разрастание сосудов; D-клетки пролиферата.




Рис. 15. Микрофотограмма. Большое увеличение. Тот же препарат. Грануляционное воспаление в перимизии. А-мышцы; В-леримизий; С-сосуд; D-клетки пролиферата.




Рис. 16. Поверхность мочевого пузыря со стороны слизистой на 3-й день после пересадки плаценты. А-слизистая мочевого пузыря; В-свищевое отверстие.

Acquiring the continuent of all continuents defined all all and appropriate the continuents of the continuen




Рис. 17. Микрофотограмма. Среднее увеличение. Пролиферация в ткани перимизия.

А-мышцы; В-перимизий; С-сосуды с периваскулярным инфильтратом; D-клетки пролиферата.




Рис. 18. Микрофотограмма. Малое увеличение. Сращение трансплантата со стенкой мочевого пузыря. А-стенка мочевого пузыря; В-трансплантат; С-место соединения-фиб-

от трансплантата. К последнему эти элементы, вероятно, принесены с током крови.

Протокол № 9. Собака "Аза", весом 15 200 г. оперирована 31.V. 1939 г. Для наркоза применен 5% раствор морфия в количестве 4 см3. По средней линии в направлении к лобку вскрыта брюшная полость. Между мочевым пузырем и влагалищем сделан свищ диаметром в 10—11 мм. После проверки тщательности наложения анастомоза брюшная полость послойно защита наглухо. Вскоре после окончания операции животное проснулось и в удовлетворительном состоянии помещено в клетку.

В первые же дни после операции собака чувствовала себя вполне удовлетворительно: принимала пищу, пила воду, двигалась, ласкалась. Пузырновлагалищный свищ функционировал с первого дня. Разрез на животе зажил пер-

вичным натяжением. Других изменений у животного не наблюдалось. Вторая операция произведена на 43-й день после первой. Под смешанным морфийно-эфирным наркозом вскрыта брюшная полость в области старого руб-ца с иссечением последнего. Мочевой пузырь оказался пустым. Стенка влагалища прочно срослась со стенкой мочевого пузыря. Вокруг анастомоза образовались мощные спайки, которые разрушены частично острым и частично тупым способом. Стенка мочевого пузыря и передняя стенка влагалища разъединены. Диаметр отверстий как в мочевом пузыре, так и во влагалище-12 мм. Края свища мочевого пузыря утолщены и резко очерчены. Над свищом мочевого пузыря со стороны серозы наложен кусочек свежей гомогенной плаценты (2 × 2 см), прикрепленный четырьмя кетгутовыми швами к серозной поверхности пузыря. Свищевое отверстие влагалища зашито наглухо узловатыми кетгутовыми швами. Брюшная полость послойно защита наглухо.

После операции животное вскоре проснулось. На второй день собака была очень вялой, не принимала пищи, слабо реагировала на окружающее. Мочеотделение - произвольное, но моча выделяется в небольшом количестве и, вероятно,

неполностью. На трегий день после операции собака погибла.

На вскрытии найдено, что брюшина потеряла блеск, в брюшной полости имеется небольшое количество мочи. Мочевой пузырь содержит до 20 см3 мочи. При осмотре вырезанного мочевого пузыря со стороны серозной поверхности установлено, что траснилантат на месте свищевого отверстия укрепился довольно прочно, и только в одном месте как будто имелось незначительное едва заметное разъединение, через которое, повидимому, просачивалась в свободную брюшную полость моча. У края трансплантата отмечалась гиперемия стенки мочевого пузыря. Ткань трансплантата представляла собой гомогенную массу с несколько бугристой поверхностью. Серовато-желтоватым цветом трансплантат довольно заметно выделялся на поверхности мочевого пузыря.

Со стороны слизистой свищевое отверстие имело овальную форму, размеры его -1×0 ,3, глубина -0,4 см. Свищевое отверстие со стороны серозы закрывал трансплантат. Ткани стенок мочевого пузыря у трансплантата, заметно сближенные, придавали свищевому ходу конусообразную форму с усеченной вершиной, обращенной к серозе. Края свищевого хода, обращенные в просвет пузыря, слегка приподнимались, были отдалены друг от друга и имели папилломатозный характер (рис. 16).

Микроскопическое исследование ткани из стенки мочевого пузыря, взятой из раздичных мест и особенно у свищевого хо-

152 - 4

да, показывает, что слизистая мочевого пузыря на всем протяжении покрыта многорядным эпителием. Подслизистая складчата, богата сосудами и, как обычно, переходит в мышечные слои мочевого пузыря. Последние состоят из мускульных пучков, идущих в продольном и поперечном направлениях. Соединительная ткань перимизия с расположенными в ней местами сосудами мелкоклеточно инфильтрирована. Многие вены переполнены кровью, артерии пусты. Вблизи артерий кое-где отмечаются периваскулярная пролиферация и мелкоклеточная инфильтрация. Ближе к серозе и особенно к трансплантату мелкоклеточная инфильтрация и пролиферация в субсерозной ткани местами весьма значительны. Здесь происходит значительное разрастание молодой грануляционной ткани, причем пролиферат распространяется и на расположенную над серозной плацентарную ткань

(рис. 17).

Ткань плаценты сохранена в виде гомогенной массы, причем часть трансплантата, прилегающая к мочевому пузырю, резко инфильтрирована и тесно соединена со стенкой мочевого пузыря. Поверхность трансплантата весьма разрыхлена и пребывает в состоянии некробиоза-некроза. Трансплантат, покрывающий серозу мочевого пузыря, интенсивно инфильтрирован клетками, как и соединительнотканная прослойка мочевого пузыря под серозой. Граница между трансплантатом и мочевым пузырем мало заметна; лишь кое-где видна полоска фибрина, который в виде сеточки расположен между трансплантатом и серозной поверхностью мочевого пузыря. В этой сеточке волокна фибрина местами утолщены, местами нежны и тонки. Тонкие отросточки фибрина без заметной границы переходят как в трансплантат; так и в стенку мочевого пузыря. В фибринозной сеточке расположены фибробласты, полибласты, лимфоциты и другие клеточные элементы пролиферата.

В мышечном слое обнаруживается оставшаяся после операции образования пузырновлагалищного свища ткань нитки; вокруг нее происходит разрастание молодой грануляционной ткани, клетки которой проникают между отдельными волокнами

нитки (рис. 18).

Протокол № 11. Собака "Муза", весом 20 000 г, оперирована 14.VI.1939г. Для наркоза применен 5% раствор морфия в количестве 4 см³. В процессе операции дополнительно дан эфирный наркоз. Искусственный пузырновлагалищный свищ диаметром 10 мм наложен по выработанной нами методике. Брюшная полость зашита наглухо.

На следующий день собака производит впечатление вялой, от пищи отказывается, глаза мутные. Пузырновлагалищный свищ функционирует: моча

непроизвольно вытекает через влагалище.

В последующие дни животное стало чувствовать себя лучше, с каждым днем оно становилось бодрее, веселее. Операционная рана зажила первичным натяжением.

На 28-й день после первой операции произведена вторая. По направлению старого рубца (с иссечением последнего) вскрыта брюшная полость. Анастомоз между мочевым пузырем и влагалищем сросся прочно и окружен значительными спайками. Спайки рассечены скальпелем, частично расслоены пальцами, и таким способом мочевой пузырь отделен от влагалища. Как в мочевом пузыре, так и во влагалище имеются свищевые отверстия диаметром 10 мм. Края свища мочевого пузыря несколько утолщены.

На свищевое отверстие со стороны серозы мочевого пузыря наложена пластинка свежей собачьей плаценты 3×2 см и толщиной 2 мм, укреплена в краям четырьмя узловатыми кетгутовыми швами. Влагалищный свищ зашит

узловатыми швами. Брюшная полость послойно закрыта наглухо.

12. VII собака вялая, глаза мутные, лежит неподвижно, однако пищу и воду принимает. Живот несколько вздут. Мочится произвольно. 13. VII состояние собаки резко ухудшилось, она отказывается от пищи и питья, живот вздут. 14. VII животное погибло.

На вскрытии брющина мутная, сальник покрывает мочевой пузырь и соединен с ним фибринозными спайками. В брюшной полости выявляется моча, но отверстия свища, покрытого плацентарным трансплантатом, не видно. Трансплантат плаценты сохранен и плотно прикрывает свищевое отверстие. Края плаценты истончены и сливаются с серозной поверхностью мочевого пузыря.

Соединение трансплантата с подлежащей тканью мочевого пузыря во всех участках, повидимому, тесное. Трансплантат отделяется пальцем от подлежащей ткани с некоторым усилием

(рис. 19).

Слизистая мочевого пузыря складчата; свищевое отверстие, закрытое со стороны серозы, имеет со стороны слизистой кратерообразное углубление. Слизистая оболочка вокруг этого углубления приподнята, складчата, папилломатозна. Дно углубления образовано трансплантатом, который соединен со слизистой

(рис. 20).

При рассматривании микропрепарата из стенки мочевого пузыря видно, что свищевое отверстие не закрыто полностью трансплантатом. Края свищевого отверстия отстоят далеко друг от друга, у свищевого отверстия имеется папилломатозное разрастание слизистой. Сосочковый слой, распространяясь по всему свищевому ходу и достигая поверхности субсерозной и серозной ткани мочевого пузыря, подходит и под трансплантат. Таким образом, трансплантат над свищевым отверстием был приложен не к серозной и субсерозной ткани, а к вывернутой наружу слизистой мочевого пузыря.

Над свищевым отверстием трансплантат местами некротизировался. В тех же местах, где ткань плаценты соприкасается с субсерозной тканью стенки мочевого пузыря, в трансплантате отмечается резкая инфильтрация и даже образование грануля-

ционной ткани, богатой клетками пролиферата.

Грануляционное воспаление видно и в мышечных слоях, особенно в межмышечных соединительнотканных прослойках перимизия. Грануляционное воспаление, повидимому, связано с наличием трансплантата. У свищевого отверстия вновь образованный грануляционный вал у места соприкосновения с многорядным эпителием слизистой мочевого пузыря над свищевым от-

верстием тянется в виде небольшой полоски, которая по направлению к центру свища обрывается, и в этих местах видны только гомогенные некротические массы трансплантата. Таким образом, над щелевидным отверстием свища в этом случае трансплантат не пророс грануляционной тканью и не закрыл свищевого отверстия. Нужно полагать, что это произошло вследствие резкой эпителизации с напилломатозным разрастанием слизистой свищевого отверстия (рис. 21).

Мускульные слои у свищевого отверстия покрыты со всех

сторон многослойным эпителием мочевого пузыря.

Слизистая мочевого пузыря покрыта многорядным эпителием, у свищевого отверстия видно мощное и папилломатозное разрастание ее. Но в местах соприкосновения с трансплантатом, в свищевом ходе происходит резкая инфильтрация и пролиферация в

подслизистой (рис. 22).

Результат операции в этом случае был неблагоприятным: трансплантат не закрыл свищевого хода. Однако мы видим, что на 4-й день трансплантат в субсерозной ткани мочевого пузыря вызывает мощное разрастание грануляционной ткани (рис. 23). Во вновь образованной грануляционной ткани происходит весьма энергичное фибробластическое превращение (рис. 24). При окраске по Ван-Гизону видны фибробласты с их нежными отростками, тяжами и в виде нежной сеточки располагающиеся над субсерозной тканью. Трансплантат некротизирован в наружной части, частично секвестрирован в результате протеолитического действия лейкоцитов, расположенных на грануляционной ткани.

Трансплантат, лежащий над широким просветом свищевого отверстия, соприкасаясь с эпителиальными тканями, не прорастает грануляционной тканью; поэтому не происходит закрытия дефекта. Ниточный материал в стенке субсерозной ткани мочевого пузыря сохранен полностью и организован за счет вновь

разросшейся фиброзной ткани.

Протокол № 12. Собака "Злючка", весом 8300 г. оперирована 13.VII. 1939 г. Для наркоза применен 5% раствор морфия в количестве 2 см³, дополненный затем эфирным наркозом. Наложен искусственный пузырновлагалищный свищ диаметром до 8 мм. Брюшная полость послойно закрыта нахлухо.

На следующий день после операции собака чувствовала себя удовлетворительно, принимала пищу и питье, поднималась на ноги. Пузырновлагалищный

свищ функционировал.

В последующие дни собака день за днем становилась все бодрее и веселее, двигалась по клетке, хорошо реагировала на окружающее. Истечение мочи через влагалище происходило непрерывно. Операционная рана заживала вто-

ричным натяжением.

На 10-й день произведена повторная лапаротомия. Старый, еще не совсем заживший кожный рубец вырезан до апоневроза, вскрыта брюшная полость, сальник свободно отодвинут кверху и обнажено место анастомоза мочевого пузыря с влагалищем. Вокруг анастомоза фиброзные спайки рассечены ножем и раздвинуты пальцем. Пузырь отделен от влагалища. Как в мочевом пузыре, так и во влагалище имеются отверстия диаметром до 8 мм. Края отверстия на мочевом пузыре обрывисты и неровны. Плацентарный трансплантат площадью 2×2 см и толщиной не более 2 мм освеженной поверхностью наложен на серозу моче-

вого пузыря и закрывает свищевое отверстие. Он прикреплен четырьмя кетгутовыми шами. Свищевое отверстие во влагалище закрывается узловатыми шелковыми швами. Влагалище и мочевой пузырь погружены. Брющная полость

зашита наглухо.

На следующий день после операции животное вялое, глаза мутные, не ест, но воду пьет, на ноги не поднимается, на окружающее реагирует слабо. Мочится произвольно. В последующие дни собака оправлялась чрезвычайно медленно. Мочеиспускание все время произвольное. На седьмой день после операции животное было убито путем введения в сердце 20 см³ 10% раствора формалина.

При вскрытии сальник нежными фибринозными спайками соединен с мочевым пузырем, особенно у места наложения трансплантата.

Эти спайки легко разрушаются пальцами и сальник отодви-

гается кверху. Мочевой пузырь наполнен и растянут.

Поверхность мочевого пузыря гладкая, чистая, блестящая, кроме места, к которому был приложен трансплантат: здесь поверхность шероховата. Трансплантат заменен фиброзной тканью

спаек. Свищевой ход закрыт полностью (рис. 25).

Слизистая мочевого пузыря выражена отчетливо в виде правильно расположенных складок. Свища со стороны слизистой почти не видно, лишь складчатость у этого места представляется более мелкой и менее правильной. Место свища можно обнаружить в виде плотной фибринозной полоски, если раздвинуть складки слизистой. Эта полоска отличается от окружающей слизистой как цветом, так и строением, напоминая грануляционную ткань рубца, покрытую тонким слоем эпителия.

Из различных отрезков стенки мочевого пузыря приготовлены микропрепараты. При рассматривании под лупой со стороны серозы над свищевым ходом плацентарного трансплантата нет. Подсерозная соединительная ткань резко, раза в два-три утолщена. Свищевой ход закрыт полностью преимущественно вновь образованной грануляционной тканью, которая, разрастаясь, вы-

ступает в просвет мочевого пузыря и покрыта слизистой.

Мышечные пучки отрезков у свищевого хода с окружающими их соединительнотканными прослойками перимизия особых изменений не обнаруживают; перимизий разросся в значительной степени, что способствует сближению краев и закрытию свищевого хода.

Под микроскопом серозная поверхность мочевого пузыря у свищевого отверстия состоит из грануляционной и фиброзной ткани. Местами сохранились остатки трансплантата в виде участков фибриноидного некроза, окрашенного кислым фуксином

в красный цвет.

Подсерозная ткань свищевого хода на месте трансплантата значительно утолщена благодаря разрастанию грануляционной ткани. Во вновь образующейся грануляционной ткани много тонкостенных сосудов, которые в некоторых местах составляют сосудистые сети; отмечается также образование но-

вой коллагенной ткани. Среди вновь образованной грануляционной ткани встречаются эпителиальные группы клеток, подвергшихся, повидимому, атрофии. Слизистая оболочка у свищевого отверстия срослась, но не везде покрыта эпителием. У свищевого отверстия подслизистая резко утолщена за счет разрастания грануляционной ткани (рис. 26). Между мышечными слоями, прилегающими к свищевому отверстию, разрослась грануляционная и рубцовая ткань.

В этом случае мы можем заключить, что на 7-й день после операции происходит полное зарастание свищевого отверстия за счет вновь образовавшейся грануляционной ткани. Грануляционная ткань, повидимому, разрастается на месте трансплантата со стороны субсерозного слоя (рис. 27 и 28). Разрастание грануляционной ткани происходит также и со стороны перимизия межмышечной ткани и подслизистой у свищевого отверстия. Вновь образованная грануляционная ткань эпителизируется.

Протокол № 13. Собака "Волчиха", весом 20 200 г, оперирована 14.VI. 1939 г. по принятой нами методике. Брюшная полость послойно закрыта наглухо. На следующий день состояние животного удовлетворительное: собака встает на ноги, передвигается по клетке, принимает пищу и воду. На окружающее реагирует хорошо. Образованный пузырновлагалищный свищ функционирует.

В последующие дни собака быстро поправлялась, прибавляла в весе. Опе-

рационная рана зажила первичным натяжением.

На 28-й день произведена повторная лапаротомия. Старый рубец иссечен, вскрыта брюшная полость, обнажены мочевой пузырь, влагалище и матка. Задняя стенка мочевого пузыря и передняя стенка влагалища на месте соединения срослись прочно и окружены довольно мощными спайками. Спайки рассечены скальпелем, частично расслоены пальцами, мочевой пузырь отделен от влагалища. В мочевом пузыре и влагалище свищевые отверстия диаметром до 11 мм. Края мочевого пузыря обрывисты, утолщены. Кусочек свежей собачьей плаценты 3×2.5 см и толщиной 2 мм освеженной поверхностью наложен на серозную поверхность пузыря и закрывает свищевое отверстие. Трансплантат прикреплен четырьмя кетгутовыми швами к серозе пузыря. Отверстие во влагалище зашито узловатыми кетгутовыми швами. Брюшная полость послойно зашита наглухо.

Аз следующий день после операции собака не принимала пищи, но воду пила. Глаза мутные, на ноги не встает. Мочеиспускание произвольное. Еще через день состояние собаки улучшилось: она начала вставать и принимать пищу. В последующие дни состояние все улучшалось. Мочеиспускание все время произвольное. Операционная рана зажила первичным натяжением.

На 12-й день после повторной операции с трансплантацией плаценты животное было убито путем введения в сердце 20 см³ 10% раствора ляписа.

На вскрытии сальник покрывает мочевой пузырь, но пальцами довольно свободно отодвигается кверху. Незначительные фибринозные спайки, которыми сальник соединен с мочевым пузырем у места трансплантата, легко разъединяются без нарушения закрытого трансплантатом свищевого отверстия.

Серозная поверхность мочевого пузыря в том месте, где был наложен трансплантат, резко шероховата и состоит из отдельных выпячиваний, иногда весьма значительных. Свищевое отвер-

стие закрыто трансплантатом плотно. Края трансплантата неза-

метно переходят в ткань мочевого пузыря (рис. 29).

Слизистая мочевого пузыря складчата. На месте бывшего свищевого отверстия кратерообразное углубление. Слизистая вокруг этого углубления приподнята, со складками; поверхность складок гладкая, они уплощены. Углубление оканчивается слепо и, повидимому, образовано тканью трансплантата. Ткань здесь неровная, с весьма уплощенными папилломатозными складочками (рис. 30). Из стенки мочевого пузыря, особенно у места свищевого отверстия, вырезаны кусочки для приготовления микропрепаратов.

Над местом свищевого хода произошло полное зарастание свищевого отверстия. Слизистая у места сращения тонка, папилломатозна. Под слизистой видны мышечные пучки, отстоящие далеко друг от друга; между ними имеется грануляционная ткань. Субсерозный слой у места сращения состоит из грануляционной фиброзной ткани; эта ткань в виде клиновидного образования заполняет бывший просвет свищевого хода, подходя к

слизистой.

Микроскопическое исследование подтверждает, что свищевое отверстие закрыто полностью. Со стороны серозного и субсерозного слоев на месте трансплантации произошло значительное разрастание соединительной ткани. Она заполняет промежуток между краями соединенных краев, проникает и смешивается с перимизием мускулярных слоев, распространяясь до слизистой мочевого пузыря (рис. 31).

Мышечные слои мочевого пузыря соединены у места сращения грануляционной тканью, которая переходит в перимизий мышечных пучков без границы. Подслизистая и слизистая у места сращения имеют незначительную папилломатозную складчатость. Сосочки складочек всюду покрыты многослойным эпителием мочевого пузыря. Местами подслизистая, у места соединения оте-

ка, богата грануляционной тканью (рис. 32).

Можно сделать вывод, что у животного после пересадки трансплантата свищевое отверстия на 12-й день закрылось полностью вновь образованной грануляционной тканью, которая превратилась в рубцовую. Несмотря на то, что эта рубцовая ткань расположена на протяжении 0,6—0,7 см, она всюду покрыта слизистой с многослойным эпителием; к тому же слизистая имеет явно выраженную складчатость.

Протокол № 14. Собака "Найда", весом 20 700 г, оперирована 11, VI. 1939 г. Создан пузырновлагалишный свищ диаметром до 11 мм. Брюшная полость зашита наглухо.

На следующий день после операции состояние собаки удовлетворительно.

Моча непроизвольно вытекает через влагалище.

В последующие дни собака хорошо ела и пила, ходила по клетке. Моча непроизвольно вытекала через искусственный пузырновлагалищный свищ. Операционная рана зажила первичным натяжением.

На 31-й день после первой операции произведена повторная лапаротомия. Старый рубец иссечен, вскрыта брюшная полость, анастомов между мочевым пузырем и влагалищем, наложенный при предыдущей операции, найден окруженным мощными фибринозными спайками. Спайки и старый шов рассечены скальпелем, а затем тупым способом влагалище отделено от мочевого пузыря. В мочевом пузыре и влагалище отверстия диаметром до 12 мм. Края свища мочевого пузыря обрывисты, несколько утолщены.

На свищ в мочевом пузыре со стороны серозы наложена пластинка свежей гомогенной плаценты (3 × 2,5 см), укрепленная четырьмя кетгутовыми

швами. Брюшная полость зашита наглухо.

На следующий день после операции собака в удовлетворительном состоянии: пьет воду, принимает пищу, мочится произвольно. В последующие дни состояние все лучше. Операционная рана зажила первичным натяжением. На 18-й день после повторной операции животное убито путем впрыскивания в сердце 25 см³ 10% раствора формалина.

Вскрытие брюшной полости показало следующее: сальник подходит к мочевому пузырю и на месте расположения транснлантата сросся со стенкой мочевого пузыря; от мочевого пузы-

ря сальник пришлось отделить ножницами.

Со стороны серозы поверхность мочевого пузыря на месте трансплантации неровная, резко бугристая, с значительными углублениями. Трансплантат неразличим. На месте трансплантации в центре имеется углубление. Ткань здесь плотна, имеет фиброзный характер как по краям углубления, так и на дне его

(рис. 33).

Мочевой пузырь вырезан для изготовления препарата. Со стороны слизистой оболочки место бывшего свищевого отверстия имеет вид втянутого радиально складчатого углубления. Дно углубления в виде узенькой полоски состоит из плотной ткани и является местом соединения краев свищевого хода. Поверхность углубления шероховата, несколько папилломатозна. Радиарные складки образовались, повидимому, за счет рубцевания и

некоторой гиперплазии слизистой (рис. 34).

Из стенки мочевого пузыря на месте сращения свищевого хода приготовлены микропрепараты. Со стороны серозы мочевого пузыря вблизи свищевого хода видна жировая ткань сальника, которая тесно сращена с надмышечной соединительной тканью мочевого пузыря и вновь образовавшейся грануляционной тканью (рис. 35). Слизистая мочевого пузыря со значительными папилломатозными разрастаниями. Слой ткани, закрывающий свищевое отверстие, весьма значителен. Он состоит из богатой сосудами грануляционной ткани и фиброзной ткани (рис. 36). Со стороны пузыря этот слой не покрыт эпителием. Он постепенно переходит и сливается с соединительнотканным надмышечным слоем мочевого пузыря, с перимизием мышечных слоев и с подслизистой.

Таким образом, фиброзная ткань, закрыв полностью свищевое отверстие, сблизила и края его. Они только значительно толще, чем вновь образованная фиброзная ткань, а кроме того, покрыты на всем протяжении многорядным эпителием мочевого




Рис. 19. Стенка мочевого пузыря со стороны серозной поверхности на 4-й день после операции.

А-трансплантат плаценты; В-нерассосавшиеся кетгутовые швы у краев трансплантата.




Рис. 20. Стенка мочевого пузыря со стороны слизистой оболочки на 4-й день после операции.

А-место бывшего свищевого отверстия: В-папилломатозные складочки слизистой.




Рис. 21. Микрофотограмма, Большое увеличение. Свищевой ход.

А-многорядный эпителий слизистой мочевого пузыря с одного крав свища; В-папилломатозное разрастание многослойного эпителия с другого края свищевого хода; С-свищевой ход.




Рис. 22. Микрофотограмма. Среднее увеличение. Слизистая мочевого пузыря у места соприкосновения с трансплантатом и у свищевого хода.

А-многорядный эпителий мочевого пузыри; В-подслизистая с резким пролиферативным воспалением в ней; С-сосуд; D-клетки пролиферата.




Рис. 23. Микрофотограмма. Большое увеличение. Место сращения трансплантата со стенкой мочевого пузыря. А-ткань стенки мочевого пузыря, которая без границы переходит в ткань трансплантата; В-трансплантат; С-фибробласты; D-полибласты и другие клетки пролиферата.




Рис. 24. Микрофотограмма. Большое увеличение. Вновь образованная ткань на месте трансплантата. А-сосуд; В-фибробласты; С-полибласты.




Рис. 25. Стенка мочевого пузыря со стороны серозной поверхности на седьмой день после операции.

А-место трансплантата.




Рис. 26. Микрофотограмма. Малое увеличение. «Слизистая ткань свищевого хода у места сращения.

А - елителий слизистой; В - подслизистая ткань; С - место сращения (подслизистых; D - воспаление в подслизистой.



Рис. 27. Микрофотограмма. Малое увеличение. Стенка мочевого пузыря с разросшейся грануляционной тканью на месте трансплантата.

А - стенка мочевого пузыря; В-грануляционная ткань на месте трансплантата,




Рис. 28. Микрофотограмма. Среднее увеличение. А-мышечный слой пузыря; В-соединительнотканный слой резко утолщен и без границы переходит в разросшуюся грануляционную ткань на месте трансплантата; С-сосуды с пролифератом.

Consequence of social and a consequence of the cons




Рис. 29. Стенка мочевого пузыря со стороны серозной поверхности на 12-й день после операции. А-место трансплантации плаценты; В-впячивания на месте трансплантата.




Рис. 30. Стенка мочевого пузыря со стороны слизистой оболочки на 12-й день после операции.

А-место бывшего свищевого отверстия с кратерообразным углублением; В-приподнятая и сглаженияя слизистая вокруг бывшего свищевого отверстия; С-папилломатозные складочки на дне бывшего свищевого отверстия.




Рис. 31. Микрофотограмма. Среднее увеличение. Место соединения трансплантата со стенкой мочевого пузыря. А-мышечная ткань мочевого пузыря; В-вновь образованиая ткань на месте трансплантата; С-капилляры; D-фиброзная ткань.




Рис. 32. Микрофотограмма. Малое увеличение. Слизистая мочевого пузыря над местом свищевого хода. А-многослойный эпителий слизистой пузыря; В-отек в подслизистой; С-капилляры с периваскулярным инфильтратом; D-мелкоклеточный инфильтрат в подслизистой.



Рис. 33. Поверхность мочевого пузыря со стороны серозы.

А - углубление на месте бывшего трансплантата над свищом; В - место прикрепления сальника с остатками последнего.




Рис. 34. Поверхность мочевого пузыря со стороны слизистой.

А-- шелевидное углубление на месте бывшего свища; В-радиарная складчатость.




Рис. 35. Микрофотограмма. Малое увеличение. Место соединения трансплантата со стенкой мочевого пузыря.

А-мышцы мочевого пузыря; В-надмышечная соединительная ткань мочевого пузыря; С-вновь образованная грануляционная ткань на месте трансплантата; D-сальник.




Рис. 36. Микрофотограмма. Малое увеличение. Разрастание фиброзной ткани на месте трансплантата над свищевым ходом. А-стенка мочевого пузыря, без резкой границы, переходящая в ткань, которая вновь образовалась на месте трансплантата; В-сосуды; С-фиброзная ткань.




Рис. 37. Микрофотограмма. Малое увеличение. Остаток свищевого хода со стороны слизистой.

А - свищевой ход; В-многорядный эпителий; С-резкая инфильтрация в слизистой и подслизистой.




Рис. 38. Микрофотограмма. Малое увеличение. Слизистая мочевого пузыря и свищевого хода.

А-свищевой ход; В-эпителий; С-подслизистая, резко инфильтрированная лейкоцитами-полинуклеарами; D-отек в подслизистой.




Рис. 39. Микрофотограмма. Малое увеличение. Экссудативное воспаление вокруг нитки.

А-мышцы; В-нитка; С-гнойный инфильтрат; D-скопление инфильтрата.




Рис. 40. Микрофотограмма. Малое увеличение. Место сращения свищевого хода с наружной стороны. А-мышечная ткань; В-рубцовая ткань; С-ткань сальника.




Рис. 41. Микрофотограмма. Малое увеличение. Наружная ткань мочевого пузыря у места свищевого хода.

А-мышцы; В-ткань сальника; С-наружный соединительнотканный слой мочевого пузыря с рубцовым разрастанием в нем; D-мелкоклеточный инфильтрат, и лейкоциты-полинуклеары.




Рис. 42. Микрофотограмма. Малое увеличение. Мышечная ткань мочевого пузыря у места сращения свищевого хода. А-мышцы; В-резкая инфильтрация грануляционной ткани с преобладанием в ней лейкоцитов-полинуклеаров.




Рис. 43. Микрофотограмма. Малое увеличение. Слизистая мочевого пузыря у места свищевого хода.

А-остатки эпителия; В-отечная подслизистая; С-переполненные кровью сосулы; В-инфильтрат с большим количеством лейкоцитов-полимуклеаров.

пузыря (рис. 37). Здесь слизистая складчата, но папилломатозные разрастания незначительны. Подслизистая находится в состоянии отека и некоторого пролиферативного воспаления. Очаги воспаления в виде клеточного инфильтрата хорошо выражены и в перимизии мышечных слоев, особенно у места сближе-

ния краев свищевого хода.

Таким образом, на основании микроскопического исследования мы можем судить, что при закрытии свища трансплантатом происходит значительное разрастание грануляционной ткани с переходом ее в фиброзную ткань. Эти разрастания ткани и зарастание свищевого отверстия, повидимому, в значительной степени обусловлены трансплантатом, благодаря которому из наружной соединительнотканной субсерозной прослойки мочевого пузыря происходит энергичный рост грануляционной ткани. Последняя по трансплантату, как по мостику, нарастает со всех сторон над свищевым отверстием и закрывает его. Ссединительнотканная прослойка со стороны слизистой местами покрывается эпителием в два-три ряда. Складчатость со стороны подслизистой незначительна, и эпителий поэтому непосредственно расположен на вновь образованной грануляционной ткани.

Протокол № 15. Собака "Фишка", весом 9600 г. оперирована 14.VI.1939 г. по обычной методике образования искусственного пузырновлагалищного свища Брюшная цолость зашита наглухо.

После операции собака постепенно оправлялась. Операционная рана зажи-

ла первичным натяжением. Пузырновлагалищный свищ функционировал.

На 28-й день после первой операции произведена повторная лапаротомия. В месте соединения мочевой пузырь и влагалище прочно срослись. Мощные спайки рассечены скальпелем и частично расслоены пальцами; мочевой пузырь отделен от влагалища. В мочевом пузыре и в стенке влагалища имеются свищевые отверстия диаметром до 7 мм. Отверстия зашиты узловатыми шелковыми швами. После этого брюшная полость зашита наглухо.

Послеоперационный период проходил довольно гладко. Операционная ра-

на зажила первичным натяжением. Моченспускание произвольное.

На 12-й день после вторичной операции животное убито путем впрыскивания в сердце 10% раствора формалина в количестве 25 см³.

На вскрытии установлено, что сальник сросся с местом свищевого отверстия в мочевом пузыре. Место свищевого хода на задней стенке мочевого пузыря, ближе к его дну, плотно прикрыто приросшим сальником. Со стороны слизистой на месте бывшего свищевого отверстия имеется углубление. Слизистая мочевого пузыря вокруг этого углубления складчата. Стенки мочевого пузыря над углублением срослись, свищевое отверстие закрыто. Толщина стенки мочевого пузыря на месте сращения гораздо меньше, чем в остальной части. Слизистая вокруг свищевого углубления отечна.

В месте сращения взяты кусочки для приготовления микропрепаратов. Под лупой видно, что края стенок мочевого пузыря у свищевого отверстия сближены друг с другом таким образом, что слизистая подходит к слизистой пышными складочками, покрытыми эпителием (рис. 38). Между краями слизистой

сохранилась щель; таким образом, сращения не произошло. Мускульные слои, в свою очередь, покрыты слизистой с эпителием, далеко отстоят друг от друга и не сращены. Только у самой наружной части стенки мочевого пузыря виден валик вновь образованной соединительной ткани, а под ним ниточный материал с некоторой воспалительной реакцией вокруг. За счет этой тоненькой соединительнотканной прослойки, нужно думать, и

происходит закрытие свищевого отверстия.

Микроскопически со стороны слизистой оболочки пузыря у места свищевого отверстия видно резкое папилломатозное разрастание слизистой. Слизистая как бы вывернута своими папилломатозными разрастаниями наружу и эти вывернутые сосочковые образования сближены благодаря операции. В папилломатозных образованиях, покрытых толстым слоем эпителия, отмечается резкий воспалительный грануляционно-экссудативный процесс. Строма сосочков богата лейкоцитами-полинуклеарами и гнойными клетками. Местами гнойный экссудат встречается в виде скоплений. Строма сосочков резко отечна, эпителий в них местами десквамирован в той или другой степени.

Мускульные слои, как было отмечено, далеко отстоят друг от друга и покрыты разросшейся подслизистой и папилломатозными разрастаниями слизистой. Перимизий между мускульными слоями утолщен благодаря разрастанию грануляционной

ткани. Сращения мускульных слоев не произошло.

Со стороны субсерозы видно грануляционное разрастание и образование новой фиброзной ткани, состоящей из нежных молодых клеточек; здесь много сосудов. Вновь образованная фиброзная прослойка в подслизистой местами спаяна тканью сальника и соединяет стенки мочевого пузыря. Кое-где встречается ниточный материал с резким экссудативно-продуктивным воспалением вокруг. Экссудат богат лейкоцитами-полинуклеарами

(рис. 39).

В этом случае мы можем полагать, что заращение свищевого хода на 12-й день после зашивания свищевого отверстия без наложения плацентарного трансплантата происходит неудовлетворительно. Края свищевого хода срастаются за счет сальника и некоторого разрастания субсерозной ткани мочевого пузыря. Однако срастание слизистых протекает весьма неблагоприятно. Сближенные мускульные концы, покрытые слизистой мочевого пузыря, не срастаются. Гнойное воспаление слизистой на 12-й день опыта способствует разрушению вновь образованной ткани, а также мешает регенерации.

Протокол № 16. Собаке "Мушке", весом 13 800 г., 11.VI.1939 г. по обычной методике наложен искусственный пузырновлагалищный свищ диаметром до 10 мм. Брюшная полость зашита наглухо.

После операции состояние животного с каждым днем улучшалось. Операционная рана зажила первичным натяжением. Образованный пузырновлага-

лищный свищ функционировал.

На 31-й день после первой операции произведена повторная лапаротомия. Анастомоз между мочевым пузырем и влагалищем вокруг свища состоит из плотной, повидимому фиброзной, ткани, мочевой пузырь путем рассечения спаек скальпелем и отсепаровки тупфером отделен от влагалища. В стенках пузыря и влагалища имеются свищевые отверстия диаметром 10—11 мм. Отверстия зашиты наглухо узловатыми шелковыми швами. Послойно закрыта брюшная полость.

Послеоперационный период прошел вполне удовлетворительно. Восстановленный мочевой пузырь функционировал нормально. Операционная рана зажила первичным натяжением. На 18-й день после повторной операции собака была убита введением в сердце 10% раствора ляписа в количестве 10 см³.

Вскрытие показало, что мочевой пузырь покрыт сальником, местами прочно сращенным с серозной поверхностью мочевого пузыря, особенно там, где было зашито свищевое отверстие.

Слизистая мочевого пузыря на месте бывшего свищевого отверстия складчата, со щелевидным углублением. Вокруг этого

углубления слизистая гиперемирована и отечна.

На микропрепарате из ткани стенки мочевого пузыря соответственно месту сближения краев свищевого хода под лупой видно, что края свищевого отверстия сближены, повидимому, вплотную, свищевого отверстия нет. Края срослись при помощи тонкой соединительнотканной прослойки, которая местами инфильтрирована. Места сращения раза в два тоньше, чем стенка мочевого пузыря. Над местом сращения краев свищевого хода видно мощное наслоение ткани сальника, проникающей, повидимому, и между сближенными краями свищевого отверстия (рис. 40). Ткань сальника приросла и к ниточному материалу, выступавшему из стенки мочевого пузыря в просвет брюшной полости.

При рассматривании препарата под микроскопом со стороны серозной поверхности над местом сращения краев свищевого хода видна ткань сальника с резко расширенными сосудами и очагами грануляционного воспаления. В тех местах, где сальник прирос к субсерозной оболочке мочевого пузыря, а также коегде и у места сращения отрезков свищевого хода, выявляется экссудативное, преимущественно гнойное воспаление.

Гнойный инфильтрат иногда в виде небольших гнойничков встречается преимущественно в мускулярных слоях и особенно в подслизистой, у места сращения свищевого хода. Сальник не только прирос к серозе, но ткань его проникает и в глубину между сближенными краями свищевого отверстия (рис. 41). Ткань сальника, таким образом, является своеобразным трансплантатом, благодаря которому произошло срастание свищевого отверстия.

Мышечные слои срослись вследствие разрастания грануляционной ткани, резко инфильтрированной лейкоцитами-полинукле-

арами (рис. 42).

Срастание слизистых оболочек свищевого хода не произошло полностью. Слизистая не на всем протяжении покрыта эпителием. Подслизистая у места соединения краев свищевого отвер-

стия имеет переполненные кровью сосуды, резко отечна, инфильтрирована лейкоцитами-полинуклеарами, а также мелкими клетками.

В подслизистой в некоторых местах встречаются кровоизлияния. Отек в подслизистой широко распространен, особенно вокруг места сближения краев свищевого отверстия (рис. 43).

Папилломатозного строения слизистой с подслизистой в этом случае у места свищевого хода нет. Регенерация эпителия, повидимому, ограничена. Фигур деления клеток эпителия не мно-

Из описания этого препарата следует, что после зашивания свища без наложения трансплантата плаценты на 18-й день после операции срастания сшитых краев свищевого отверстия произошло преимущественно за счет сальника, который на поверхности мочевого пузыря толстым слоем прикрывает свищевое отверстие, а у места соединения краев слизистой мочевого пузыря кое-где даже врастает между соединенными краями. Имеется разрастание вновь образованной грануляционной ткани. Экссудативный характер воспаления в этом случае резко выражен и превалирует над продуктивным. Слизистая местами остается обнаженной. В подслизистой отмечаются отек и воспаление.

Следует обратить внимание на то, что ниточный материал в этом случае во всех слоях имеет вокруг гнойный инфильтрат в том или другом количестве. Инфильтрация и экссудация отмечаются во всех слоях мочевого пузыря, и в этом нужно усматривать неблагоприятное условие для заживления свища. Неблагоприятно отзывается на заживлении присутствие ниточного мате-

риала, поддерживающего гнойное воспаление.

В общем эксперименты образования искусственного пузырновлагалищного свища у животных полностью себя оправдали. Свищи функционировали у всех наших подопытных животных. На вскрытии мы убеждались в том, что края искусственных свищей приобретали примерно такой же внешний вид, как и свищи, возникающие вследствие родовой травмы (рубцовые изменения, нередко отложения мочевых солей).

Из 14 животных одно погибло от наркоза, а четыре вследствие перигонита, повидимому, обусловленного недостатками оперативной техники наложения искусственных пузырновлагалищных свищей (эти животные погибли в самом начале наших

опытов).

Оставшимся в живых 9 животным были произведены повторные операции, причем в 7 случаях на свищевое отверстие в мочевом пузыре мы накладывали трансплантат гомогенной плаценты. У 2 собак свищевые отверстия в стенках влагалища и мочевого пузыря были зашиты без применения трансплантата (контроль).

Из 7 животных, которым была произведена пересадка гомогенной плаценты для закрытия свищевого отверстия в мочевом пузыре, одно погибло через сутки после операции (повидимому от наркоза), два — на 3-й день и одно — на 4-й день. Смерть наступила, повидимому, от перитонита, возникшего вследствие мочевого затека.

Остальные животные прожили от 7 до 18 дней и были умерщвлены для исследования. Добытые макропрепараты мочевого пузыря показали, что трансплантат плаценты уже через сутки довольно прочно соединяется с подлежащей тканью мочевого пузыря. В случаях мочевого затека слипание трансплантата с серозной поверхностью мочевого пузыря также было прочным и обнаружить отверстия, через которые моча проникала в брюшную полость, нам не удалось. Микроскопически слипание плацентарного трансплантата с почвой также подтверждено. Таким образом, мы можем считать установленным, что между трансплантатом плаценты и серозной поверхностью мочевого пузыря в опыте на животных уже через сутки происходит довольно прочное соединение.

У погибшего через сутки животного, которому на свищевое отверстие мочевого пузыря был наложен плацентарный трансплантат, при макро-и микроскопическом исследовании препарата выявилось, что приложенный к серозной поверхности мочевого пузыря трансплантат соединен с нею прочно; ткань плаценты находится, повидимому, в состоянии некробиоза, так как утратила свое компактное строение. Соединение плацентарного трансплантата с подлежащей тканью мочевого пузыря происходит благодаря фибринозному наслоению, причем фибринозные нити исходят из соединительной ткани мочевого пузыря. Видимо, плацентарный трансплантат является стимулятором разрастания молодой грануляционной ткани.

На третьи сутки плацентарный трансплантат также сохранен, но поверхностная часть его уже разрыхлена и находится в состоянии некробнозанекроза. Граница между трансплантатом и стен-

кой мочевого пузыря становится мало заметной.

На четвертые сутки трансплантат частично некротизируется и вызывает мощное разрастание грануляционной ткани, причем в этой ткани происходит весьма энергичное фибробластическое превращение.

На седьмые сутки мы видим лишь остатки трансплантата в виде фибриноидного некроза, а серозная поверхность мочевого пузыря у свищевого отверстия состоит из грануляционной и фиброзной ткани. В это же время отмечается уже полное закрытие свищевого отверстия за счет вновь образовавшейся грануляционной ткани, которая разрастается, надо полагать, на месте трансплантата.

На двенадцатые сутки трансплантата уже нет. Микроскопически подтверждается, что свищевое отверстие к этому времени закрывается полностью. На месте трансплантата выявляются разрастания соединительной ткани, которая заполняет промежуток между краями свищевого отверстия.

На восемнадцатые сутки на месте трансплантата имеется уже

плотная фиброзная ткань.

Таким образом, мы можем утверждать, что в опыте на животном свищевое отверстие, закрытое плацентарным трансплантатом без освежения и соединения краев, на седьмые сутки закрывается вследствие мощного разрастания грануляционной ткани, а на двенадцатые сутки закрывается уже полностью с переходом грануляционной ткани в фиброзную.

Мы считаем, что соединение плацентарного трансплантата с подлежащей неосвеженной поверхностью мочевого пузыря происходит благодаря особым литическим свойствам плаценты.

Третьяков производил эксперименты на кроликах. Он создавал у них искусственно в полых органах брюшной полости, в том числе и в мочевом пузыре, сквозные дефекты, а затем закрывал их соответствующим образом обработанным куском женской плаценты, не сшивая краев дефекта. По поводу соединения плаценты с подлежащей тканью органов он говорит: "Эта способность плацентарной ткани, надо полагать, является ее наиболее сильным, доминирующим свойством, благодаря которому плацента так легко фиксируется и приживает к тканям, биохимические процессы которых отличаются от таковых в трансплантате, т. е. плацента, повидимому, очень неприхотлива к той почве, на которую ее пересаживают". Третьяков утверждает, что, несмотря на неблагоприятные условия, в которые ставился плацентарный трансплантат в его экспериментах, все трансплантаты без исключения удерживались на поверхности полых органов. Очень скоро образовывался спаивающий слой между трансплантатом и полым органом, на который трансплантат был пересажен, и принявший трансплантат орган, несмотря на сделанную в нем фистулу, повидимому, нормально функционировал с фистулой, прочно защищенной трансплантатом. Содержимое органа не вытекало в брюшную полость.

В наших экспериментах гомогенная плацента также быстро спаивалась с серозной поверхностью мочевого пузыря, но для большей уверенности мы все же укрепляли трансплантат четырьмя кетгутовыми швами. Все же в 3 случаях моча попадала в брюшную полость, и животные погибли от развившегося перитонита.

Таким образом, наши экспериментальные данные не сходятся в отношении нормального функционирования полого органа с данными Третьякова, который экспериментировал на кроликах,

пересаживая им гетерогенную плаценту человека.

В микроскопических исследованиях, произведенных в различные сроки после пересадки плаценты, Третьяков констатировал, что приживший у кролика трансплантат плаценты человека некоторое время от 6 до 10 дней сохраняет свою структуру и имеет вид свежей ткани. После этого трансплантат постепенно

начинает рассасываться, и только через 4—6 месяцев на месте трансплантата можно обнаружить соединительнотканный рубец.

В наших экспериментах рассасывание гомогенного трансплантата начиналось значительно раньше: на 12-й день после пересадки ткани трансплантата мы уже совершенно не обнаруживали, на его месте происходило рубцевание свищевого отверстия. Из этого можно заключить, что пересаженная плацента человека, повидимому, значительно дольше сохраняет структуру живой ткани. В клинической части нашей работы упоминалось о том, что добытый нами через 48 часов после пересадки трансплантат плаценты человека сохранил вид свежей ткани, без каких либо изменений, что подтвердилось микроскопическим исследованием.

24 эксперимента над кроликами, по утверждению Третьякова, во всех случаях дали безотказное приживление трансплантата над фистулами различных полых органов животного. Отверстие в этих случаях настолько прочно закрывалось трансплантатом, что содержимое полых органов не попадало в свободную брюшную полость. Надо полагать, что и все взятые в эксперимент животные выжили.

Мы такого эффекта не получили. В трех опытах над собаками моча все же протекала в брюшную полость. Хотя нам не удалось обнаружить отверстий, через которые просочилась моча, мы все же можем предполагать существование микроскопических сообщений.

Вместе с тем мы особенно хотим подчеркнуть, что трансплантат гомогенной плаценты также довольно прочно соединялся с подлежащей серозной поверхностью мочевого пузыря во всех случаях без исключения, что установлено нами и микроскопически. Наши данные в этом отношении не расходятся с данными, полученными Третьяковым при пересадке гетерогенной плаценты.

В одном случае, когда слизистая мочевого пузыря была вывернута и непосредственно соприкасалась с трансплантатом, закрытия свищевого отверстия не произощло. Можно предположить, что плацентарный трансплантат не способен соединиться со слизистой оболочкой мочевого пузыря.

Во всех наших экспериментах плацентарный трансплантат стимулировал разрастание грануляционной ткани на серозной поверхности мочевого пузыря, распространяя свое влияние на все слои его стенки вплоть до слизистой и не вызывая вместе с тем экссудативного воспаления в тканях. Сам трансплантат также прорастал грануляционной тканью. Грануляционная ткань нарастала по трансплантату, как по мостику, и впоследствии превращалась в фиброзную.


Таким образом, микроскопические исследования показывают, что гомогенный плацентарный трансплантат в состоянии закрыть свищевое отверстие полностью в довольно короткий срок.

В двух случаях зашивания свищевых отверстий в мочевом пузыре без применения трансплантата плаценты срастание краев свищевого хода произошло за счет сальника, послужившего своеобразным трансплантатом. Сальник прочно спаивался с местом наложения швов на свищевое отверстие и таким образом закрывал его. Хотя свищевые отверстия закрылись, и функция мочевого пузыря восстановилась, все же микроскопическое исследование в этих случаях показало, что края свищевого отверстия срослись неудовлетворительно. Отмечалось экссудативное воспаление слизистой пузыря, которое способствовало разрушению вновь образованной грануляционной ткани и мешало регенерации. Чрезвычайно неблагоприятно отзывалось на заживлении свищевого отверстия присутствие ниточного материала, поддерживавшего гнойное воспаление. Следовательно мы можем отметить, что более благоприятное заживление происходит при наличии плацентарного трансплантата.

К недостаткам наших экспериментов необходимо отнести то, что мы не имели возможности применять трансплантат для закрытия пузырновлагалищного свища со стороны влагалища, а при накладывании трансплантата со стороны брюшной полости получалось соединение сальника с поверхностью мочевого пузыря как вблизи трансплантата, так и с самым трансплантатом. Это до известной степени может создать впечатление, что в заживлении свищевых отверстий играет определенную роль и сальник. Чтобы избегнуть этого, необходимо было производить резекцию сальника, но это явилось бы чрезвычайно тяжелым вмешательством, способным повлечь за собой гибель животных в неже-

лательные для нас сроки.

Все же надо сказать. что анализ исследований не уменьшает значения изучения влияния плацентарной ткани на заживление искусственно созданных свищей без освежения и сведения краев свищовых отверстий.



V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ

Из исторического обзора лечения мочеполовых свищей у женщин мы видим, какое большое внимание уделялось этому вопросу. Различными авторами предложено много разных способов хирургического вмешательства с тем, чтобы радикально помочь страдающим женщинам.

Сам метод оперативного вмешательства со стороны влагалища представляет довольно большие трудности. Однако надо считать твердо установленным, что наиболее физиологичным вмешательством будет операция фистулорафии через влагалище.

Наилучшим методом, с нашей точки зрения, на данном этапе следует признать расширенное расшепление стенки влагалища и стенки мочевого пузыря с применением разрезов Атабекова. Этот метод, особенно в руках автора, в настоящее время дает наилучшие результаты. Вместе с тем необходимо отметить и недостаток метода, а именно его сложность.

Мы считаем, что совершенствование метода лечения свищей

и его упрощение все еще стоит в порядке дня.

Предлагаемый нами метод хирургического лечения пузырновлагалищных свищей с применением плацентарной ткани, особенно у больных, еще ни разу не подвергавшихся оперативному вмешательству, дал в целом ряде случаев полное излечение после первой же нашей операции. Даже в тех случаях, когда больные уже неоднократно подвергались операции свища, наш метод все же дал вполне ободряющие результаты.

При нашем методе не требуется тщательного зашивания свищевого отверстия, так как плацентарный трансплантат в довольно короткий срок прочно соединяется с серозной поверхностью мочевого пузыря. Произвольное мочеиспускание уста-

навливается уже через несколько часов после операции.

Наши эксперименты с гомогенной плацентой, а также опыты Третьякова с гетерогенной плацентой показывают, что плацентарная ткань в короткий срок прочно слипается с серозной поверхностью мочевого пузыря и вызывает мощное разрастание грануляционной ткани, которая затем, превращаясь в фиброзную, закрывает свищевое отверстие полностью. В наших экспе-

152 - 5

риментах это устанавливалось уже к 12-му дню после наложе-

ния трансплантата.

Такое быстрое слипание плацентарного трансплантата с подлежащей тканью мы объясняем литическими свойствами плаценты, которые, повидимому, сохраняются и в ее частице. Энергичный рост грануляционной ткани, очевидно, обусловливается тем, что плацента богата гормонами и содержит значительное количество глютатиона.

Придавая немаловажное значение глютатиону в вопросе стимулирования заживления ран, а в даном случае свищевых отверстий, мы произвели определение глютатиона в 17 доношенных плацентах человека вскоре после их рождения (табл. 1).

Таблица 1 Определение глютатиона в доношенной плаценте человека

Общий глюта-	Окисленный глюта- Восстановлени глютатион	
в мг%	6 на 100 г плацентарн	ой ткани
90,0	50,8	39,2
26,4	16,6	9,8
24,6 22,6	6,8 16,4	17,8 6,2
17,8	13,5	4,3
29,4	20,8	8,6
24,6	14.8	9,8
38,0	20,2	17,8
55,8	23,2	22,6
20,2	14,0	6,2
15,4	9,9	5,5 11,0
27,6 55,2	16,6 34,4	20.8
64,4	39,8	24,6
38,0	16,0	22,0
23,4	8,0	15,4
44,8	23,0	21,8

Из таблицы 1 мы видим, что содержание общего глютатиона в плаценте значительно и колеблется от 15,4 до 90,0 мг⁰/₀.
Количество окисленного глютатиона по отношению к восстановленному в большинстве случаев, выше. Если считать, что
успешное заживление свищевых отверстий зависит от наличия
глютатиона в плаценте, то такое определение его в плаценте
нас, естественно, удовлетворить не могло. Необходимо
принять во внимание, что плацента нами не всегда могла
быть использована сразу: мы могли применить только лишь
тщательно проверенную плаценту, а для этого необходимо

некоторое время. Мы предприняли исследование 4 плацент на содержание глютатиона сразу же после их рождения, а затем через некоторые промежутки времени, стремясь выявить динамику содержания глютатиона на протяжении суток. Полученные данные приводятся в таблице 2.

Таблица 2 Количество глютатиона в плаценте в различные часы после ее рождения

Часы опре-	Вес кусочка	Общий глюта-	Окисленный глютатион	Восстановлен вый глютатион
глютатнона	плаценты	в мг% на	100 г плацент	арной ткани
0	0,980	24,41	9,39	15,02
0,5	0,570	32,29	5,39	26,90
I	0,638	26,92	2,88	24,04
2	0,810	29,92	14,78	15,14
4	0,990	12,39	4,33	8,06
24	0,690	20,90	11,11	9,79
0	0,900	26,92	2,04	24,88
0,5	0.660	41,82	10,13	31,69
1	0,830	38,06	12,56	25,50
2 4	0,609	37,31	10,22	27,09
4	0,890	26,53	7,58	18,95
24	0,820	33,29	4,12	29,17
0	0,650	17,00	2,40	14,60
0,5	0,800	15,33	9,96	5,37
10	0,580	23,58	12,46	11,12
2	0,675	16,81	1,84	14,97
4	0,790	25,24	12,43	12,81
24	0,820	27,31	3,74	23,57
0	1,085	11,32	2,56	8,76
0,5	0,690	16,89	4,89	12,00
1	0,720	14,91		11,93
2	0,897	14,36	2,98 2,77	11,59
2 4	0,730	18,49	2,94	15,55
24	0,650	19,82	8,44	11,38

Эта таблица показывает, что в течение суток происходят значительные и вместе с тем неравномерные колебания в содержании глютатиона. Это позволяет нам вывести заключение, что выгоднее всего применять плаценту при лечении пузырновлагалищных свищей не позже, чем через два часа после ее рождения, так как за это время, по нашим данным, не происходит значительных сдвигов в содержании общего глютатиона.

Наша работа выдвигает и ряд других проблем. Поскольку плацентарная ткань является стимулятором роста молодой грануляционной ткани, наша клиника поставила вопрос о применении ее при лечении хронических язв (например, язвы голени). Первые результаты этой работы положительны. Выяснилось также, что плацентарная ткань способствует размягчению рубцовой ткани; это, по нашему мнению, может иметь большое значение при различных косметических операциях.

Общие наши выводы таковы:

1. Способ хирургического лечения пузырновлагалищных свищей у женщин с применением плацентарной ткани в качестве свободного трансплантата является простым и эффективным.

2. Применение плацентарной ткани при хирургическом лечении пузырновлагалищных свищей, особенно не подвергавшихся

операции, дает наилучшие результаты.

3. В случаях, когда пузырновлагалищные свищи подвергались операции, применение плацентарной ткани также повышает количество излечений; если не наступает полное излечение после первой операции, то все же отмечается значительное улучшение.

4. Плацентарная ткань, примененная в качестве трансплантата, уже с первых суток прочно соединяется с подлежащей тканью

мочевого пузыря.

5. Плацентарная ткань является мощным стимулятором разрастания грануляционной ткани, которая в эксперименте на животных превращается в фиброзную и закрывает свищевое отверстие полностью.

6. Плацентарная ткань, примененная в качестве свободного

трансплантата, не вызывает экссудативного воспаления.

7. Плацентарная ткань оказывает благоприятное влияние на характер рубцовой ткани, которая размягчается и становится более эластичной.

ЛИТЕРАТУРА

Абражанов А. А., Аутопластический способ зашивания влагалищнопузырного мочевого свища, "Журнал акушерства и женских болезней", т. XV, 1901.

Александров Е. К., Обзор свищей женского полового канала, на-блюдавшихся в течение 15 лет (1917—1931), Сборник, посвященный проф. Горизонтову, стр. 19-35, Новосибирск, 1935.

Андреев, К терапии неизлечимых мочевых влагалищных свищей. Случай неизлечимого пузырно-уретро-влагалищного свища с полным разрушением

уретры, "Врач", стр. 833-866, 1890.

Ануфриев А. А., К вопросу о пузырно-цервикальных фистулах и описание пяти случаев подобного рода фистул, окончившихся полным выздоровлением, "Журнал акушерства и женских болезней", стр. 815, 1891.

Арчаков И. И., О влиянии трансплантации плацентарной ткани на яичники и получение гормональной стерилизации, монография, Моск. обл. на-

учно-исслед. ин-т. Москва, 1937. Атабеков Д. Н., О надлонном сечении при пузырных свищах уженщин, "Журнал акушерства и женских болезней", стр. 47, 1924.

Атабеков Д. Н., Мочевые дефекты и свищи у женщин и оператив-

ное их лечение, изд. автора, Москва, 1925. Атабеков Д. Н., Повреждение мочевых путей у женщин, профилактика и борьба с ними, как с социальным злом. Труды VIII всесоюзного съезда акушеров и гинекологов, автореферат, стр. 387, 1930.

Бартельс, К вопросу о патофизиологическом действии хориона ран-

них сроков беременности, "Гинекология и акушерство*, № 6, 1934.

Бекман В. Г., К технике оперативного закрытия пузырновлагалищных свищей, "Хир. Архив", № 5, 1911.

Березнеговский, О переседке мочеточников в кишечник,

сертация, Томск, 1908.

Благовещенский Д. А., Высокое сечение пузыря, как фактор в деле заживления пузырновлагалищного свища, "Журнал акушерства и женских болезней", 1910.

Богданов П. Ф., К вопросу об оперативном лечении уретро-влагалищ-

ных фистул, "Журнал акушерства и женских болезней", № 11, стр. 38, 1895.

Богораз Н. А., Простейший метод оперативного лечения недержания мочи при дефектах мочепузырной шейки и уретры, "Журнал акушерства и женских болезней", 1912.

Борисович В. В., Простой способ зашивания пузырновлагалищных

свищей "Медиц. Обозрение Нижнего Поволжья", № 11-12, стр. 65, 1927.

Бубличенко Л. И., Влагалищные фистулы по материалам Акуш.-гинек. института за 1909—1921 гг. "Русская клиника", № 45, стр. 66—76, 1928.

Васильев Б. Н., Операция эпизиоклеизиса в сочетании с уретропластикой, "Журнал акушерства и женских болезней", кн. 6, стр. 769, 1929.

Введенский Д. А., К оперативному лечению свищей шейки мочевого пузыря путем кровавого дублирования ее стенки, "Уральск. Медиц. Журн.", № 1, стр. 82-84, 1930.

Вебер Ф. К., К вопросу о распознавании и лечении пузырношеечных мочевых свищей, "Врач*, № 14, стр. 419—420, 1899. Вебер Ф. К., Случай пузырновлагалищного свища, излеченного пере-

садкой кожного лоскута, "Врач", № 28, стр. 851, 1900. Волкович Н. М., Способ пластического закрытия тяжелых пузырновлагалищных свищей при помощи матки, "Журнал акушерства и женских болезней", т. XV, 1901.

Геринштейн, Случай спонтанного излечения гнойного пузырнопри-

даткового свища, "Гинекология и акушерство", № 10, стр. 48, 1939.

Горохов Д. Е., Случай маточно-пузырновлагалищного свища, "Медиц.

Обозрение", № 12, стр. 1136, 1893.

Готлиб Я. Г., Лечение пузырношеечных свищей электрокоагуляцией "Журнал акушерства и женских болезней", кн. 5, стр. 653, 1929.

Груздев, Уретропластика по идее проф. М. С. Субботина в гинеко-

логической практике, "Русский врач", стр. 1145, 1902.

Груздев, К терапии пузырных свищей у женщин, "Руский врач", № 3, 1904.

Губарев А. П., К оперативному лечению высоких пузырновлагалищных свищей, "Журнал акушерства и женских болезней", № 12, стр. 1099, 1895.

Губарев А. П., Об оперативном лечении недержания мочи, "Журнал акушерства и женских болезней", стр. 707, 1898. Гудим-Левкович Д. А., К оперативному лечению недержания мочи

у женщин, Сборник, посвященный проф. Розанову, стр. 130, 1934. Гуртовой Л. Е., К вопросу о шеечновлагалищных свищах, "Журнал акушерства и женских болезней*, кн. 5, стр. 646, 1929.

Двемлянинов Е. П., К технике зашивания пузырновлагалищных сви-

щей "Уральск. Медиц. Журн.", № 2, стр. 87—90, 1928. Дворжец С. М., Пересадка мочеточников в кишку при неоперабильпузырновлагалищных свищах, "Акушерство и Гинекология", № 6, стр. 105, 1937.

Драницын А. А., Случай излечения порочного развития мочеиспускательного канала, осложненного недержанием мочи, "Журнал акущерства

и женских болезней , стр. 567, 1894.

Драницын А. А., Лечение пузырношеечных свищей путем отделения мочевого пузыря от шейки матки и преимущество, этого способа сравнительно с другими методами, применяемыми со стороны влагалища, "Журнал акушерства и женских болезней", № 9, стр. 1005, 1898.

Егоров, Биологическая активность препаратов яичников, плаценты и мозгового придатка, "Журнал акушерства и женских болезней", № 5, 1933.

Ефимова К. Е., К технике закрытия женских мочеполовых свищей

путем интерпозиции матки, "Врач. Газета", № 5, стр. 306, 1929.

Живатов Г. К., К оперативному лечению двусторонней мочеточникововлагалищной фистулы после расширенной экстирпации матки. "Акушерство и гинекология", № 4, стр. 25, 1933.

Заянцкий С. С., К вопросу об этнологии и терапии мочеточниково-

влагалищных фистул, "Хир. Летопись", № 3, 1891.

Заянцкий С. С., Оперативное лечение пузырновлагалишных фистул, осложненных разрушением мочеиспускательного канала, "Журнал акушерства и женских болезней", стр. 996, 1894.

Зеленин К. И., Hyperemesis gravidarum, как плацентарная токсемия, "Акушерство и гинекология", № 5-6, 1929.

Земацкий И. Ф., О надлонном сечении мочевого пузыря при оперировании пузырновлагалищных свищей, "Врач", стр. 25, 1897.

Земацкий И. Ф., О зашивании пузырновлагалищных свищей по ло-

скутному методу, "Врач", № 30, стр. 216, 1897. Игрицкая А. Б., Результаты оперативного лечения пузырновла-

галищных свищей, "Акущерство и Гинекология", № 10, стр. 44, 1939.

Ильин А. И., К вопросу о восходящей инфекции почек и борьбе с нею при пересадке мочеточников в кишечнике, диссертация, СПБ, 1913.

Исаакян А. Н., Два случая пузырновлагалищных свищей тяжелой формы, оперированных по способу Mackenrodt, с некоторой модификацией проф. Кушталова, "Журнал акушерства и женских болезней", № 3, 1926.

Исаев В. М., Пересадки и сращивания, монография, Москва-Ленин-

Казунин, Замечания к методике зашивания пузырновлагалищных свищей,

"Акушерство и Гинекология", № 12, стр. 80, 1938.

Какушкин Н. М., Как восстановить разрушенный жом женского мочевого пузыря и его соустья с мочепротоком, "Саратовск. Вестник Здравоохранения", № 1, 1923.

Какушкин Н. М., Мочеточниково-влагалищный свищ. Восстановление соустья между пузырем и мочеточником влагалищным путем, "Журнал

акушерства и женских болезней*, № 2, стр. 121, 1925.

Каннегиссер, К вопросу о свищах мочеточников, Труды II съезда

рос. акуш.-гинек., стр. 124. Кипарский Р. В., Хирургия сложных мочеполовых фистул, доклад в Лен. акуш.-гинек. обществе, 1933.

Кипарский Р. В., Методы восстановления отсутствующего моченспускательного канала и сфинктера у женщин, доклад на IX съезде акуш.-гинек., Москва, 1935.

Колдаев Б. М., Глютатіон, його властивості та роль у фізіології і патології, монография, Киев, ВУАН, 1935.

Котелянский Б., Episiocleisis cum fistula rectiovaginalis arteficialis "Медиц. Обозрение", № 12, стр. 1136, 1893.

Кузнецкий Д. П., О лечении мочеполовых свищей у женщин, "Акушерство и Гинекология", № 9, стр. 72, 1938.

Кузнецов С. И., Влагалищный способ зашивания двухсторонних мочеточниковых свищей, "Акушерство и Гинекология", № 9, стр. 75, 1938. Кузьмин П. И., Случай операции эпизиоклеизиса при fistula vesicourethro- et rectovaginalis, "Медиц. Обозрение", стр. 1030, 1892. Кунцевич И. А., Материалы к вопросу об оперативном лечении мочеполовых свищей у женщин, диссертация, СПБ, 1896.

Кушелевский А. П., Малая акушерско-гинекологическая урология, Москва, 1938.

Лидервальд А. К., К вопросу о мочеполовых свищах у женщин и их оперативном дечении, диссертация, СПБ, 1894.

Липинский С. А., Несколько случаев мочеполовых фистул, оперированных в гинекологическом отделении Могилевского родовспомогательного заведения за последние 4 года, "Журнал акушерства и женских болезней", стр. 1014, 1891.

Лисовская С. Н., К вопросу об оперативном лечении пузырновлагалищных свищей, Сборник, посвященный проф. Хольцову В. Н., стр. 151-

Ломнов Г. М., Случай свежего зашивания пузырновлагалищного свища после родов в Рождественском родильном приюте, "Журнал акушерства и женских болезней*, стр. 275, 1908.

Любимов А. А., Бактериологическое исследование налетов, развивающихся во влагалище и пузыре в некоторых случаях при мочевых фистулах, "Журнал акушерства и женских болезней", № 2, стр. 129, 1898.

Магидсон М. И., Образование искусственного мочевого пузыря из тонкой кишки, как метод лечения обширных мочеполовых свищей, "Вестник

Хирургии", № 1, стр. 64, 1938.

Мажбиц А. М., О ранениях мочевого пузыря при гинекологических операциях, "Журнал акушерства и женских болезней", № 1, стр. 47, 1933.

Мажбиц А. М., Спонтанное заживление мочеполовых фистул у жен-

щин, доклад в Ленингр. акуш. гинек. Обществе, 1933.

Мажбиц А. М., Акушерско-гинекологическая урология с атласом, монография, Ленинград, 1936.

Мажбиц А. М., Хирургический метод дечения мочеполовых фистул у женщин. "Советская Медицина*, № 21, стр. 20, 1938.

Малиновский, К этиологии и терапии свищей полового канала женщины, Сборник, посвященный Груздеву, стр. 510-688, Петроград, 1917-1923.

Мандельштам А.Э., Влагалищный способ зашивания двусторон-них мочеточниковых свищей, "Журнал акушерства и женских болезней", № 2-3, стр. 48, 1932.

Мандельштам А. Э., Новый атипический способ зашивания пузырновлагалищных свищей. Сборник трудов госпитальной акуш.-гинек. клин.,

посвященный 125-летию ХМИ, стр. 193-198, 1936.

Мандельштам А. Э., О диагностике и оперативном лечении мо-четочниково-влагалищных свищей, "Акушерство и Гинекология", № 11,

стр. 126, 1937.

Мандельштам А. Э., О заплатном методе зашивания пузырновлагалищных свищей после удаления матки. "Акушерство и Гинекология", № 5, стр. 84, 1938.

Марков Н. В., К казунстике пузырновлагалищных свищей, "Журнал

акушерства и женских болезней", 1915.

Мельников А. К., К вопросу об образовании искусственного мочевого пузыря и уретры, Сборник, посвященный проф. Хольцову Б. Н., стр. 171-179, 1929.

Миротворцев С. Р. Экспериментальные данные к вопросу о пе-

ресадке мочеточников в кишечник, диссертация, СПБ, 1909.

Михайлов Н. М., Об оперативном лечении недержания мочи по способу проф. Губарева, "Журнал акушерства и женских болезней". № 9, стр. 1099, 1900.

Михельсон А. И., К этиологии самопроизвольных пузырновлага-

лищных свищей, "Акумерство и Гинекология", № 10, стр. 46, 1939;

Моновский Н. К., Несколько слов по поводу статьи Н. М. Волковича "Способ пластического закрытия пузырновлагалищных свищей при помощи матки", "Журнал акушерства и женских болезней", т. XV, 1901.

Морозова А. Н., К вопросу о плацентарной патологии и ее диагностиче-

ской ценности, "Московский Медиц. Журнал", № 3, 1931.

Мыкертчьянц М. Г., Излечение недержания мочи перинеоррафиею. несколько слов о последней вообще и сравнительная оценка ее со способом Lawson-Tait'a, "Журнал акушерства и женских болезней", стр. 495, 1890.

Немилов А. А., Свободная пересадка органов и тканей, монография.

Ленинград, 1927.

Новацкий И., О радикальном лечении пузырновлагалищных свищей по американскому способу, "Московская Медиц. Газета", № 1-3. стр. 3-6 и 17-21, 1860.

Оденов Б. С., К вопросу диагностики и лечения сложных мочеточниково-пузырновлагалищных свищей, "Нов. Хир. Арх.", № 57, 1928.

Окинчиц А. А., К вопросу о лечении пузырно-уретровлагалищных сви-

щей, "Журнал акушерства и женских болезней", стр. 792, 1890.

Отт Д. С., Об оперативном лечении пузырновлагалищных фистул. осложненных разрушением моченспускательного канала, "Журнал акушерства и женских болезней", стр. 513, 1894.

Паженкопф К. В., Случай операции пузырновлагалищного и ки-шечновлагалищного свищей вместе, "Московская Медиц. Газета", № 12 стр. 95—

96, 1859.

Палем Х. Ф., Случай операции пузырновлагалищного свища, "Московская Медиц. Газета", № 32, 1860.

Пирожков Н. В., Операция пузырновлагалищной фистулы по американскому способу, "Московская Медиц. Газета", № 36, стр. 572, 1862.

Писарская Н. М., Операция зашивания мочеполовых свищей по материалам IX совбольницы, доклад в заседании Харьковского акуш.-гинекобщества, 1939.

Плешков, К вопросу об оперативном лечении глубоких пузырноматочновлагалищных свищей. Hysterocolpocleisis, диссертация, Москва, 1908.

Повжитков В. А., К этиологии пузырношеечных свищей, "Акушер-

ство и Гинекология*, № 12, стр. 97, 1938. Попандопуло И. В., Два случая заживления уретро-везиковаги-нальных свищей, оперированных по способу Атабекова, "Акушерство и Гине-

кология", № 6, стр. 553—556, 1927. Попандопуло И. В., Случай восстановления целости мочеиспускательного канала при полном его разрушении, "Акушерство и Гинекология",

стр. 86, 1935.

Попандопуло И. В., Упрощенный влагалищный метод операции зашивания мочеточниково-влагалищных свищей, "Акушерство и Гинекология",

№ 5, ctp. 587—593, 1927. Попандопуло И. В., К современной терапии пузырно-и уретропузырновлагалищных свищей, Труды VIII всесоюзного съезда акушеров и ги-

некологов, стр. 387, 1930.

Поюровский Г.Г., Применение постоянного орошения для подготовления пузырных фистул к оперативному лечению, "Журнал акушерства и женских болезней", стр. 553, 1894.

Розенбаум Е. Г., К вопросу об оперативном лечении недержания мочи у женщин при травматическом повреждении мускулатуры сфинктера,

"Акушерство и Гинекология", № 1, стр. 245, 1927.

Ромм Г. Д., Четыре случая оперативного закрытия у больных пузырновлагалищных свищей по новому способу W. A. Freund'a "Летопись Хирургин", № 1, стр. 95, 1899.

Рубкевич С. И., Результаты хирургического лечения мочеполовых свищей у женщин по методу расщепления, "Акушерство и Гинекология". № 1,

стр. 103, 1938.

Руднев Н. М., О лечении пузырных свищей, "Вестник Хирургии", 1926. Савинов Н. Н., Околовлагалищный и поднадкостничный способы закрытия больших и сращенных с костью пузырновлагалищных свищей, "Хирургия", № 54, 1901.

Савостицкий Г., Несколько общих замечаний о лечении пузырновлагалишных свищей и три случая их излечения, "Московская Медиц. Газета",

№№ 1—2, стр. 1—7 и 25—27, 1763.

Савостицкий Г., Краткий отчет об операциях, произведенных в полицейской больнице с 1858 по 1863 гг., "Московская Медиц. Газета", NeNe 22-35, 1863.

Савостицкий Г., Из хирургической практики. Случай разрушения мочевыводника вследствие грудных родов. Восстановление его посредством операции. Несколько оперативных способов для лечения мочевыводника, "Московская Медиц. Газета". № 40, стр. 1—17, 1863.

Савостицкий Г., О лечении мочевых свищей у женщин, диссер-

тация. Москва, 1863.

Сеткин Н А., Случай пластической операции пузырновлагалициого свища и рубцового стеноза влагалища при помощи лоскута из малой губы, "Медиц. Обозрение", № 9, стр. 834, 1896. Славянский К. Частная патология и терапия женских болезней,

стр. 184-232, 1888.

Соловьев Ф. А., Операция Волковича-Кюстнера при обширных сви-Труды 11 съезда хирургов Северо-Кавказского Края, 1926.

Соловьев А. Г., К лечению сложных свищей мочевого пузыря,

Сборник, посвященный проф. Розанову, стр. 127, 1934.

Спасокукоцкий С. И., Новый способ зашивания пузырновлагалищного свища, "Медиц. Обозрение", № 3, стр. 398, 1900.

Спасокукоцкий С. И., Пластика мочевого пузыря из кишки, "Хи-

рургия", т. XIII, стр. 646, 1903.

Терновский Н. В., О способах оперативного лечения и достигнутых результатах в случаях пузырновлагалищных свищей, наблюдавшихся в Повивальном и Клиническом институтах, "Врач", № 42, стр. 1544, 1902.

Томсон Т. И., К вопросу о мочеточниково-влагалищных свищах.

"Журнал акушерства и женских болезней", стр. 403, 1907.

Третьяков В. В., Об использовании плаценты человека, как пластического материала для свободного трансплантата, доклад на 11 укр. съезде акуш.-гинек., 1938.

Улеско-Строганова К. П., Плацентарная теория в патогенезе токсикозов беременности и в частности эклампсии, "Журнал акушерства и

женских болезней*, № 5, 1935. Ушаков А. П., К оперативному лечению пузырновлагалищных и

мочеточниково-влагалишных свищей, "Хирургия", № 1, стр. 134, 1939.

Федоров С. П., К вопросу о полном удалении мочевого пузыря у женщин, "Вестник Хирургии", т. XV, стр. 14, 1928. Федоровский М. А., Случай успешной фистулоррафии после кольпоклеизиса, "Врач. Газета", № 40, стр. 1101, 1902.

федулов Я. С., К вопросу о применении постоянного орошения при запущенных пузырновлагалищных фистулах, "Журнал акушерства и женских болезней", стр. 451, 1895.

Фейгель И., Оперативное лечение общирных дефектов мочевого пузыря с полным разрушением уретры по модифицированному способу Мартиуса, "Акушерство и Гинекология", № 2—3, стр. 55, 1935.

Феноменов Н., К вопросу о способах зашивания мочеполовых свищей у женщин, "Врач", № 21, стр. 601—605, 1896.
Феноменов Н., К вопросу о лечении мочеполовых свищей у жен-

щин, "Русский Хир. Архив", 1906. Фигурнов К. М., К топографии женского мочевого пузыря, Сборник, посвященный проф. Хольцову Б. Н., стр. 181—188, 1929. Фигурнов К. М., Оперативное восстановление вполне разрушенной уретры и замыкающего аппарата мочевого пузыря у женщины, Сборник, посвященный проф. Шевкуненко, т. П, стр. 147, 1937.

Хаскелевич М.Г., К вопросу о лечении пузырновлагалищных сви-

шей, "Акушерство и Гинекология", № 3, стр. 103, 1937.

Чайка А. А., К вопросу о способах закрытия пузырновлагалищных свищей и восстановления женской уретры, Сборник, посвященный проф. Хольцову Б. Н., стр. 167-169, 1929.

Чайковский В. Н. и Розенберг Р. М., Плацента, как инородное

тело в организме женщин. "Врач. Дело", № 9—10, 1931. Шатский А. В., К казуистике мочеточниковых свищей и излечения,

"Журнал акушерства и женских болезней", стр. 670, 1906.


"Журнал акушерства и женских оолезней", стр. 670, 1906.

Шатунов П. Г., Простой способ зашивания пузырновлагалищных свищей, "Врач. Газета", № 1, стр. 42, 1927.

Яковлев М. П., Удачный случай эпизиоклеизиса, "Журнал акушерства и женских болезней", стр, 269, 1890.


Яровой С. М., К вопросу об оперативном лечении пузырновлагалищных свищей, Юбилейный сборник Акуш.-гинек. общества, 1914.

прямую кишку Яхонтов, К вопросу о пересадке мочеточников в диссертация, Киев, 1901.



ОГЛАВЛЕНИЕ

		CTP.
1.	Введение	7
II.	Исторический обзор лечения пузырновлагалищных свищей у женщин.	11
III.	Клиническая часть	
	щей у женщин	-
IV	Образование искусственных пузырновлагалищных свищей у собак и их хирургическое лечение с применением плацентарной ткани. Макро- и	43
	микроскопические исследования	124.000
V.	Заключение и выводы	65
	Литература	69




Редакторы В. Н. Савицкий, М. И. Снежин. Техредактор Е. Н. Розенцвейг.


Корректор Н. К. Скурат.


БФ 01583. Зак. 152. Тираж 5000, Печ. лист. 4,75 — 1,75 л. вклеек. Уч. изд. лист. 7,62. Подписано к печати 22. V. 1948 г. Цена 10 руб. 60 коп. Переплет 1 руб. 20 коп.

Тип. ФЗУ. Киев, Золотоворотская, 11.









11 руб. 80 коп.